2006 藥用保健植物
種原保存開發與利用

主　編

徐原田、林俊義、陳源俊、陳忠川

行政院農業委員會農業試驗所　編印

行政院農業委員會農業試驗所特刊第122號

行政院農業委員會農業試驗所　95年7月出版

2006 藥用保健植物種原保存、開發與利用

發 行 人／林俊義
主　　編／徐原田、林俊義、陳源俊、陳忠川
主編簡介：
徐原田　行政院農業委員會農業試驗所　副研究員兼主任
林俊義　行政院農業委員會農業試驗所　所長
陳源俊　行政院農業委員會農業試驗所　聘用人員
陳忠川　中國醫藥大學中國藥學研究所　教授兼所長
副 主 編／陳邦華、林儒宏、蔡雅琴、楊舒惠、廖明章、顏銘宏、羅淑卿
劉慧瑛、蔡淑珍、黃振聲、廖俊旺、蔡孟君、賴瑞聲、劉新裕
編輯委員／徐原田、陳源俊、林儒宏、蔡雅琴、謝秀梅、范瑞浴、彭宏熙
劉德展、徐清高、徐淑貞、鍾麗芳、曾月潔、石信德、羅朝村
陳邦華
圖片攝影／徐原田、陳源俊、林儒宏、蔡雅琴、謝秀梅、陳邦華
審　　稿／陳忠川、徐原田
發行單位／行政院農業委員會農業試驗所

序

我國自古醫藥起源甚早，相傳於紀元前數千年前後，炎帝神農嚐百草，著「本草經」首開我國醫藥之先河。我中華民族之得以繁衍、滋長、茁壯，並成為當今世界上人口最多的國家，皆為此一優越之中草藥文化遺產所賜。

自古天然植物，即為人類提供了豐富的營養及醫療的資源。尤其是醫療方面常能發揮意想不到的功效，解除人類不少的痛苦。而數千年來，老祖先所遺留下來豐富的寶貴經驗，更是值得後輩們好好珍惜，發揚光大，以造福綿延世世代代的子孫。

台灣高山峻嶺，跨越寒、溫、熱各帶，且所具備的天然條件，最適宜天然植物的成長。據植物學專家統計，台灣所產植物種類的密度，竟是全世界第一，亦是對此有興趣加以研究藥用保健植物者的天堂。我國是全球中草藥生產大國，由於地大物博，幅員遼闊，天然藥物資源極為豐富，種類極多，根據 1983 － 1987 年中藥資源普查統計結果可知，中國天然藥物約 12800 種，其中藥用保健植物 11000 種，約佔 87 ％，還擁有悠久的醫藥應用歷史，數千年來累積無數的實踐經驗，且有數千部本草藥學專著和醫學典籍，為中草藥資源之開發與利用，提供了極珍貴的資料、經驗和貢獻。

所謂「醫食同源」是傳統中國醫學的特色，最理想的境界是「預防醫學」，即養生之道。數年來由於世界各國提倡自然療法，普遍重視健身保健之道，主張由自然食物中進行身體的修補工作，正是國人所謂的「醫食同源」。現代的台灣人，生活背景已經從悠閒自得的農業社會走向忙碌的工商社會，為了生活而奔波，花費在家庭中三餐的時間相對減少。反觀目前社會上各類業者自稱的「健康食品」及各種以「健康」掛帥的健康飲料、運動飲料等等化學填加物、防腐劑的加工食品充斥市面，暗中戕害國人的健康。以現代生化科技導入歷代藥源，將食補加以改良，使其味美湯鮮，沒有中藥方面的味忌，功效更顯。健康就是財富，有健康的身體，才能創造偉大的事業，過著幸福美滿的人生。

農業試驗所關西工作站已建立藥用保健植物種原圃及寶山農場木本藥用保健植物種原圃，針對此農業試驗所並已建立藥用保健植物種原資料庫、農試所作物種原中心已建構藥用保健植物種原庫，且建立多種珍貴藥用保健植物大量繁殖技術，同時開發多項藥用保健植物營養食品。並對民間藥材及常用傳統藥材展開之種原開發與利用研究，以期能提升國內中草藥產業競爭力之效果，在台灣現有之藥用保健植物進行開發與利用，對傳統醫藥國粹之發揚，全民健康之保養及治療，將有極大之助益。

本書內容分兩部分：壹、藥用保健植物種原保存簡介；貳、藥用保健植物之開發與利用。記收錄台灣較常見的中草藥 800 種，依編列每種藥草以植物之中名、學名、別

名、利用部位、功效及生育特徵、繁殖、產地等之簡介，並附彩色拍攝之圖片，圖文併茂；並在藥用保健植物之開發與利用，經著者數年來之努力研發開展下，利用本土性之保健植物開發保健飲料、香茶包、即溶香茶，以及萃取營養食品保健膠囊、多項藥材組成品優質佳之藥膳等等。本書特點，圖片清晰、逼真，文字簡明，通俗易懂，是普及性、科學性強的實用書。

編者學識淺薄，加以撰稿時間短促，遺漏或謬誤之處在所難免。值此新世紀的開始，謹以此書奉獻讀者，尚祈各界先進多予指正，以資日後憑此增補修訂。

主編：徐原田、林俊義、陳源俊、陳忠川 謹識

目 錄

一、藥用保健植物種原保存

編號 中文名稱

001 台灣天仙果 ……… 9
002 茸毛羊奶頭(樹) ……… 9
003 牛膝 ……… 10
004 土牛膝 ……… 10
005 紫莖牛膝 ……… 11
006 滿天星 ……… 11
007 節節花 ……… 12
008 青葙 ……… 12
009 刺莧 ……… 13
010 千日紅 ……… 13
011 雞冠花 ……… 14
012 紫茉莉 ……… 14
013 商陸 ……… 15
014 西洋商陸 ……… 15
015 松葉牡丹 ……… 16
016 馬齒莧 ……… 16
017 假人蔘 ……… 17
018 魚腥草（蕺） ……… 17
019 三白草 ……… 18
020 胡椒 ……… 18
021 防蚊胡椒 ……… 19
022 風藤 ……… 19
023 山苧麻 ……… 20
024 苧麻 ……… 20
025 木苧麻 ……… 21
026 虎杖 ……… 21
027 何首烏 ……… 22
028 大甲草 ……… 22
029 大飛揚草 ……… 23
030 霸王鞭 ……… 23
031 毛鉤藤 ……… 24
032 白粗糠 ……… 24
033 猩猩木 ……… 25
034 小飛揚草 ……… 25
035 麻風樹 ……… 26
036 葉下珠 ……… 26
037 蓖麻 ……… 27
038 桂花 ……… 27
039 紅花八角 ……… 28
040 蘭嶼肉桂 ……… 28
041 南天竹 ……… 29
042 狹葉十大功勞 ……… 29
043 血藤 ……… 30
044 紫陽花 ……… 30
045 虎耳草 ……… 31
046 魚藤(葡蔔) ……… 31
047 魚藤(直立) ……… 32
048 含羞草 ……… 32
049 狗尾草 ……… 33
050 大葉千斤拔 ……… 33
051 洋蓍 ……… 34
052 珊瑚油桐 ……… 34
053 皂角 ……… 35
054 恆春皂角 ……… 35
055 黃麻 ……… 36
056 黃花虱母子 ……… 36
057 落地生根 ……… 37
058 大返魂草 ……… 37
059 台灣景天 ……… 38
060 佛甲草 ……… 38
061 山葡萄 ……… 39
062 野牡丹 ……… 39
063 水丁香 ……… 40
064 過塘龍 ……… 40
065 刺五加 ……… 41
066 三葉五加 ……… 41
067 三島柴胡 ……… 42
068 高氏柴胡 ……… 42
069 老公根 ……… 43
070 長春花(紅) ……… 43
071 長春花(白) ……… 44
072 白水木 ……… 44
073 海州常山 ……… 45
074 長穗木 ……… 45
075 化石樹 ……… 46
076 白龍船花 ……… 46
077 羅勒 ……… 47
078 貓鬚草 ……… 47
079 草石蠶 ……… 48
080 半枝蓮 ……… 48
081 土荊芥 ……… 49
082 白有骨消 ……… 49
083 仙草 ……… 50
084 香茹 ……… 50
085 鼠尾癀 ……… 51
086 貢杞(長葉貢杞) ……… 51
087 野刺茄 ……… 52
088 曼陀羅(白花) ……… 52
089 枸杞 ……… 53
090 黃水茄 ……… 53
091 山煙草 ……… 54
092 通泉草 ……… 54
093 田字草 ……… 55
094 九頭獅子草 ……… 55
095 紅子莢迷 ……… 56
096 有骨消 ……… 56
097 白花蛇舌草 ……… 57
098 茅瓜 ……… 57
099 王瓜 ……… 58
100 半邊蓮 ……… 58
101 山防風 ……… 59
102 黃花蜜菜 ……… 59
103 鱧腸 ……… 60
104 紫背草 ……… 60
105 蒼耳 ……… 61
106 下田菊 ……… 61
107 大薊 ……… 62
108 西洋蒲公英 ……… 62
109 台灣蒲公英 ……… 63
110 七葉蘭 ……… 63
111 淡竹葉 ……… 64
112 香蒲 ……… 64
113 柚葉藤 ……… 65
114 蒟蒻 ……… 65
115 百部 ……… 66
116 台灣油點草 ……… 66
117 蘆薈 ……… 67
118 麥門冬 ……… 67
119 黃花萱草 ……… 68
120 百合 ……… 68
121 仙茅（大本） ……… 69
122 仙茅（小本） ……… 69
123 山藥 ……… 70
124 射干 ……… 70
125 山薑 ……… 71
126 薑黃 ……… 71
127 茶匙癀 ……… 72
128 舒筋藤 ……… 72
129 闊葉大豆 ……… 73
130 掌葉瓜 ……… 73
131 火筒木 ……… 74
132 穿心蓮 ……… 74
133 木芙蓉 ……… 75
134 埔銀 ……… 75
135 瓜葉馬兜鈴 ……… 76

編號	中文名稱	
136	港口馬兜鈴	76
137	金瘡小草	77
138	白花草	77
139	安石榴	78
140	細號嗽血草	78
141	黃醃菜	79
142	釘錘草	79
143	猿尾藤	80
144	山月桃	80
145	崖椒	81
146	猴兒草	81
147	四葉蓮	82
148	台灣黃芩	82
149	立骨羊乳	83
150	軟枝藍	83
151	葛鬱金	84
152	鈕仔茄	84
153	閉鞘薑	85
154	紫蘇	85
155	火炭母草	86
156	九里明	86
157	白鳳豆（白）	87
158	白鳳豆（赤）	87
159	散血草	88
160	車前草	88
161	一葉草	89
162	穗花毛蓮菜	89
163	辣蓼	90
164	龍葵	90
165	山澤蘭	91
166	狗肝菜	91
167	印度莪朮	92
168	水蜈蚣	92
169	綠珊瑚	93
170	接骨草	93
171	賜米草(圓葉)	94
172	賜米草(尖葉)	94
173	賜米草(白花)	95
174	蛇莓	95
175	虎尾蘭	96
176	賜米草	96
177	薄荷	97
178	韭蘭	97
179	薑三七	98
180	白紫蘇	98
181	山奈	99
182	望江南	99
183	茉草	100
184	天名精	100
185	大花蔓陀羅	101
186	通草	101
187	防葵	102
188	康福利	102
189	過山香	103
190	石菖蒲	103
191	苦藏	104
192	白鳳豆	104
193	落地生根	105
194	返魂草	105
195	黑豆	106
196	菊芋	106
197	白蓮蕉	107
198	黃花野百合	107
199	彩色尖葉蘆薈	108
200	蚌蘭	108
201	印度羅勒	109
202	南薑	109
203	金剛纂	110
204	台灣堇菜	110
205	台灣佛甲草	111
206	西蒙 1 號白甘薯	111
207	黃花馬齒莧	112
208	倒吊蓮	112
209	曇花	113
210	紅苞鴨跖草	113
211	黃花曇華	114
212	山藥	114
213	蘄艾	115
214	薄葉碎米蕨	115
215	番石榴	116
216	山茂草	116
217	白花虱母草	117
218	竹節蓼	117
219	台灣黃精	118
220	紫花曼陀羅	118
221	大本鼠尾癀	119
222	絡石	119
223	雙花龍葵	120
224	伏牛	120
225	茜草	121
226	山香	121
227	霍香	122
228	何首烏	122
229	毬蘭	123
230	咬人狗	123
231	薏苡	124
232	蕎麥	124
233	金門一條根	125
234	玉竹	125
235	六神草	126
236	石盤草	126
237	甜珠草	127
238	益母草	127
239	艾草	128
240	土牛膝	128
241	白花馬齒莧	129
242	粉藤	129
243	華澤蘭	130
244	扁蓄	130
245	臭茉莉	131
246	狹葉車錢草	131
247	堇菜	132
248	水薄荷	132
249	夏枯草	133
250	番杏	133
251	小酸模	134
252	鴨兒芹	134
253	白埔姜	135
254	生毛將軍	135
255	苦許氏草(長冠草)	136
256	羊蹄	136
257	頭花蓼	137
258	老鼠芳	137
259	蒺藜	138
260	假千日紅	138
261	馬鞍籐	139
262	倒地鈴	139
263	黃心細	140
264	腎葉山螞蝗	140
265	磨盤草	141
266	尖刀癀（刀傷草）	141
267	六角英	142
268	地榆	142
269	濱豆	143
270	白牛膝	143
271	草海桐	144
272	蛇總管	144
273	綬草	145
274	蜘蛛抱蛋	145
275	毛連菜	146
276	半枝蓮	146
277	白花藤	147
278	非洲一枝黃花	147
279	黃花蜜菜	148
280	鴨跖草	148
281	雞腳刺	149
282	光風輪	149

編號	中文名稱	
283	知母	150
284	牻牛兒苗	150
285	土沉香	151
286	馬利筋	151
287	半夏	152
288	龍牙草	152
289	假木豆	153
290	千里光	153
291	吉祥草	154
292	旋覆花	154
293	翻白草	155
294	白古蘇花	155
295	非洲蘆薈	156
296	腎蕨	156
297	月見草	157
298	鴨跖草	157
299	尖尾鳳	158
300	接骨木	158
301	水董	159
302	欒樨	159
303	玫瑰	160
304	菖蒲	160
305	菖蒲	161
306	肝炎草	161
307	天門冬	162
308	鐵包金	162
309	紫檀	163
310	輪葉莎草	163
311	老鸛草	164
312	台灣馬兜鈴	164
313	爬森藤	165
314	日本木瓜	165
315	芸香	166
316	北美一枝黃花	166
317	落地生根	167
318	莪朮	167
319	蘆莉草	168
320	蔓草蟲豆	168
321	石莧	169
322	單葉蔓荊	169
323	泰國益母草	170
324	枸杞	170
325	黃蜀葵	171
326	紅田烏	171
327	日本薄荷	172
328	黃葉地瓜	172
329	紅骨魚腥草	173
330	馬蘭	173
331	烏歛莓	174
332	假川牛膝	174
333	野薄荷	175
334	三點金草	175
335	雷公根	176
336	銳葉小槐花	176
337	紅葉鴨跖草	177
338	鳳仙花	177
339	冬珊瑚	178
340	柳葉馬鞭草	178
341	蔓苧麻	179
342	紅芋	179
343	茵蔯蒿	180
344	守宮木	180
345	決明	181
346	小駁骨丹	181
347	禾雀草	182
348	黃槿	182
349	柴胡	183
350	長穗馬蘭	183
351	廣霍香	184
352	吊蘭	184
353	苦艾	185
354	蔓榕	185
355	朴地菊	186
356	三葉葡萄	186
357	美國薄荷	187
358	山麻	187
359	日本芫荽	188
360	魚針草	188
361	對葉草	189
362	台灣八角	189
363	蘭香草	190
364	黃花蔓陀羅	190
365	穗花山奈	191
366	牡蒿	191
367	菝葜	192
368	白花曼陀羅	192
369	乳仔草	193
370	白花蔥蘭	193
371	馬鞭草	194
372	倒地蜈蚣	194
373	鼠尾癀	195
374	金銀花	195
375	白鶴靈芝	196
376	猩猩草	196
377	狐尾武竹	197
378	垂地武竹	197
379	文竹	198
380	松葉武竹	198
381	紫蘇(公館)	199
382	杭菊	199
383	山豆根	200
384	川柴胡	200
385	藁本	201
386	黨蔘	201
387	萬能薯	202
388	香蕉草	202
389	板藍根	203
390	防風	203
391	甘遂	204
392	泰國葛	204
393	香水茅	205
394	颱風草	205
395	台灣半夏	206
396	拔契	206
397	千斤藤	207
398	金絲草	207
399	野生土豆	208
400	紫花野牡丹	208
401	泰國樹蘭	209
402	雲南黃馨	209
403	黃蝦花	210
404	厚葉女貞	210
405	紅柏	211
406	紅桂花	211
407	軟枝黃槐	212
408	明日葉	212
409	金錢樹	213
410	鐵掃把	213
411	椬梧	214
412	樹薯	214
413	竹葉三七	215
414	雞母珠	215
415	台灣玉竹	216
416	小葉蘆薈	216
417	樹豆	217
418	巴豆	217
419	廣防風	218
420	小葉蟛蜞菊	218
421	假三捻	219
422	防葵	219
423	飛龍掌血	220
424	直立薄荷	220
425	椒草	221
426	小葉厚殼樹	221
427	貼梗海棠	222
428	金粟蘭	222
429	野牡丹	223

編號	中文名稱	
430	紅葉野牡丹	223
431	小葉金絲桃	224
432	石龍芮	224
433	大青	225
434	紫菀	225
435	雲南山澤蘭	226
436	新竹腹水草	226
437	台灣附地草	227
438	威氏鐵莧	227
439	蓼蘭	228
440	黃荊	228
441	睫穗蓼	229
442	山菊	229
443	戟葉蘭	230
444	金錢薄荷	230
445	肥皂草	231
446	海馬齒	231
447	塔花	232
448	一枝香	232
449	空心蓮子菜	233
450	桔梗	233
451	江某	234
452	疔仔草	234
453	藎草	235
454	紅蓖麻	235
455	桃金娘	236
456	駁骨草	236
457	雨傘草	237
458	九節木	237
459	饅頭果	238
460	裏白懸鉤子	238
461	淡竹葉	239
462	台灣鯽魚膽	239
463	瓜馥木	240
464	山油麻	240
465	硃砂根	241
466	臭牡丹	241
467	水金京	242
468	紅莧草	242
469	雞屎樹	243
470	山素英	243
471	大葉十大功勞	244
472	紅莖空心菜	244
473	排香草	245
474	白花馬鞍藤	245
475	血木	246
476	黃金桂	246
477	萬點金	247
478	紅骨蛇	247
479	胭脂花	248
480	小本山羊桃	248
481	紅雀珊瑚	249
482	黃楊	249
483	黃花馬櫻丹	250
484	黃金色馬櫻丹	250
485	粉紅色馬櫻丹	251
486	桔黃色馬櫻丹	251
487	紫色馬櫻丹	252
488	紫珠(小葉千斤拔)	252
489	山腳破	253
490	毛地黃	253
491	金午時花	254
492	海南島蘄艾	254
493	雪裡青	255
494	韭菜	255
495	紅花龍船花	256
496	山芹菜	256
497	香菇草	257
498	樹香茄	257
499	台灣洛神花	258
500	竹葉草	258
501	異葉左手香	259
502	琉璃草	259
503	牛頓草	260
504	大葉車前草	260
505	蝴蠅翅	261
506	小扁蓄	261
507	石竹（鮮紅）	262
508	石竹（紅）	262
509	石竹（粉紅）	263
510	石竹（白邊紅圍）	263
511	石竹（橘紅）	264
512	石竹（斑點紅圍）	264
513	錦葉蝴蝶	265
514	石蓮	265
515	石蓮	266
516	石蓮	266
517	石蓮	267
518	孔雀木	267
519	當歸	268
520	紅花玉芙蓉	268
521	芍藥	269
522	美葉火桐木	269
523	橡牙樹	270
524	一條龍	270
525	軟枝楦梧	271
526	裏白巴豆	271
527	小本扛板歸	272
528	立枝紅乳草	272
529	圓葉白蓮蕉	273
530	紅背鴨跖草	273
531	斑葉莎草	274
532	白花野牡丹	274
533	腹水草	275
534	甜菊	275
535	剪刀股	276
536	仙鶴草	276
537	小地榆	277
538	木防己	277
539	太陽蓼	278
540	烏芙蓉	278
541	益智	279
542	地黃(台)	279
543	問荊	280
544	大花野百合	280
545	牛蒡	281
546	丹蔘	281
547	心基葉溲疏	282
548	木蓮	282
549	白芨	283
550	大金櫻	283
551	爵床	284
552	金絲桃	284
553	錢菖蒲	285
554	荔枝草	285
555	延命草	286
556	指甲花	286
557	款冬	287
558	竹芋	287
559	竹葉蘭	288
560	毛茛	288
561	柳枝癀	289
562	龍舌癀	289
563	玄參	290
564	愛玉	290
565	猴耳	291
566	烏藥	291
567	澤蘄	292
568	苦林盤	292
569	菊三七	293
570	白梵天花(狗腳邊)	293
571	台灣木通	294
572	七葉一枝花	294
573	細辛	295
574	河北山藥	295
575	竹仔菜	296
576	紅篦麻	296

編號	中文名稱	編號	中文名稱	編號	中文名稱
577	白尾蜈蚣草 …………297	626	牛心柿 ……………321	675	檉柳 …………………346
578	檸檬香蜂草 …………297	627	山馬茶 ……………322	676	肉桂 …………………346
579	峨蓼 ……………………298	628	菌桂 ………………322	677	肖楠 …………………347
580	安國山藥 ……………298	629	山柿 ………………323	678	沉香 …………………347
581	蘭嶼裸實 ……………299	630	石柿 ………………323	679	台灣土生樟樹 ………348
582	黃連蕉 ………………299	631	紅肉李 ……………324	680	圓滑番荔枝 …………348
583	垂盆草 ………………300	632	桃接李 ……………324	681	香椿 …………………349
584	長葉紫珠 ……………300	633	黑松 ………………325	682	羅望子 ………………349
585	穗花千金拔 …………301	634	檸檬桉 ……………325	683	香水樹 ………………350
586	絞股藍 ………………301	635	杜仲 ………………326	684	蛋樹 …………………350
587	黃秋葵 ………………302	636	春不老 ……………326	685	西印度醋栗 …………351
588	野菊 ……………………302	637	猩猩木 ……………327	686	草莓番石榴(白) ……351
589	台灣鳶尾 ……………303	638	烏心石 ……………327	687	錫蘭橄欖 ……………352
590	月桃 ……………………303	639	台灣風鈴木 ………328	688	阿勃勒 ………………352
591	甘草 ……………………304	640	大葉合歡 …………328	689	波羅蜜 ………………353
592	雞血藤 ………………304	641	銀杏 ………………329	690	鴉膽子 ………………353
593	五指茄 ………………305	642	牛樟 ………………329	691	絨毛羊乳頭(牛乳榕) 354
594	半邊蓮 ………………305	643	青脆枝 ……………330	692	澳洲茶 ………………354
595	凹葉越橘 ……………306	644	樹蘭 ………………330	693	咖啡樹 ………………355
596	銅錘玉帶草 …………306	645	大葉咖啡 …………331	694	石榴 …………………355
597	准山 ……………………307	646	楊梅 ………………331	695	羅晃子 ………………356
598	萬年青 ………………307	647	大葉桃花心木 ……332	696	刺葉桂櫻 ……………356
599	射干(大陸) …………308	648	風鈴木 ……………332	697	威氏粗榧 ……………357
600	小葉六神草 …………308	649	木蓮花 ……………333	698	土番石榴 ……………357
601	開脾草 ………………309	650	玉蘭花 ……………333	699	檄樹(大溪地一號) … 358
602	決明子 ………………309	651	錫蘭肉桂 …………334	700	檄樹(大溪地二號) … 358
603	朱蕉 ……………………310	652	酸棗仁 ……………334	701	檄樹(大溪地三號) … 359
604	濱防風 ………………310	653	紅棗(平底圓形) 335	702	檄樹(馬來西亞四號) 359
605	紅刺蔥 ………………311	654	紅棗(尖底長型) 335	703	檄樹(夏威夷五號) … 360
606	樟樹 ……………………311	655	紅豆杉 ……………336	704	檄樹(本地第六號) … 360
607	蒲桃 ……………………312	656	山胡椒 ……………336	705	檄樹(本地第七號) … 361
608	甜黃皮 ………………312	657	竹柏 ………………337	706	檄樹(本地第八號) … 361
609	酸黃皮 ………………313	658	銀葉板金 …………337	707	檄樹(本地第九號) … 362
610	堇寶蓮 ………………313	659	土樟 ………………338	708	辣木 …………………362
611	山陀兒 ………………314	660	相思豆 ……………338	709	黃金果 ………………363
612	蛋黃果 ………………314	661	小葉木樨 …………339	710	毛鉤藤 ………………363
613	番龍眼 ………………315	662	軟毛柿 ……………339	711	金合歡 ………………364
614	人心果 ………………315	663	蘭嶼肉荳蔻 ………340	712	台灣海桐 ……………364
615	酸楊桃 ………………316	664	青剛櫟 ……………340	713	胡頹子 ………………365
616	華西肉桂 ……………316	665	白水木 ……………341	714	菊花木 ………………365
617	蘭嶼肉桂 ……………317	666	姑里珍 ……………341	715	胭脂樹 ………………366
618	黃梔子 ………………317	667	蘭嶼樹 ……………342	716	嘉寶果 ………………366
619	榆樹 ……………………318	668	蓮葉桐 ……………342	717	海檬果 ………………367
620	巴豆 ……………………318	669	黃厚殼 ……………343	718	小辣樹 ………………367
621	孔雀合歡 ……………319	670	黃厚殼 ……………343	719	降真香 ………………368
622	台灣黃柏 ……………319	671	火桐樹 ……………344	720	花椒 …………………368
623	檄樹(東沙十號) …320	672	五葉松 ……………344	721	喜樹 …………………369
624	大仙楂 ………………320	673	鳥不棲 ……………345	722	厚殼樹 ………………369
625	小仙楂 ………………321	674	毛苦蔘 ……………345	723	雲實 …………………370

編號	中文名稱		編號	中文名稱		編號	中文名稱	
724	茄冬樹	370	750	樟樹	383	776	三葉埔姜	396
725	麵包樹	371	751	沉香	384	777	黃槿	397
726	山刺番荔枝	371	752	海桐	384	778	小實女真	397
727	楓香	372	753	蘭嶼山馬茶	385	779	台灣紅檜	398
728	台灣欒樹	372	754	鐵刀木	385	780	無花果	398
729	鷹爪藤	373	755	藤紫丹	386	781	紫梅	399
730	左手香(木本)	373	756	尤加利	386	782	油杉	399
731	黃金桂	374	757	二葉松	387	783	油甘	400
732	黃連木	374	758	板栗	387	784	粗糠柴	400
733	光果翼核木	375	759	澳洲胡桃	388	785	沉香	401
734	接骨木	375	760	牛奶榕	388	786	恆春山枇杷	401
735	破布子	376	761	橡牙樹	389	787	高士佛赤楠	402
736	巴西乳香	376	762	蘭嶼羅漢松	389	788	大葉楠	402
737	蜂蜜桉	377	763	毛柿	390	789	土楠	403
738	七日暈	377	764	台灣火刺木	390	790	台灣赤楠	403
739	台灣山桂花	378	765	桃實百日青	391	791	小芽新木薑子	404
740	指甲花	378	766	纖楊	391	792	菲律賓胡頹子	404
741	神秘果	379	767	台東火刺木	392	793	刺杜蜜	405
742	日本女真	379	768	鐵雨傘(雨傘仔)	392	794	裏白饅頭果	405
743	雲南黃馨	380	769	小梗黃肉楠	393	795	台灣狄氏厚殼	406
744	欖仁樹	380	770	楓港柿	393	796	薄姜木	406
745	羅漢果	381	771	烏皮九芎	394	797	紫杉	407
746	珊瑚樹	381	772	野生烏梨(台灣野梨)	394	798	可可	407
747	印度紫檀	382	773	無患子	395	799	蟠桃	408
748	樹蔘	382	774	台灣櫸木	395	800	十字蒲瓜樹	408
749	金雞納	383	775	疏脈赤楠	396			

二、參考文獻 …… 409

三、藥用保健植物之開發與利用 …… 411

（一）欖樹之開發與利用 …… 411

1. 第一年開發新產品－欖樹香茶 …… 411
2. 第二年開發新產品－欖樹果粉末即溶香茶 …… 414
3. 第三年開發新產品－欖樹果營養保健食品膠囊 …… 416

（二）欖樹枝葉開發與利用—欖樹枝葉袋茶對大鼠之口服急毒性 …… 417

（三）保健植物之開發與利用 …… 418

（四）神奇辣木－印度與非洲窮人之寶 …… 422

（五）沉香泌油形成因子與機制之探討 …… 424

（六）利用本土性藥用保健植物研製多項藥膳之開發 …… 425

四、中文名索引 …… 430

五、學名索引 …… 440

一、藥用保健植物種原保存

台灣天仙果

編　　號：001

別　　名：小本牛乳埔

科　　名：桑科(Moraceae)

學　　名：*Ficus formosana* Maxim.

生育特徵：多年生灌木、大葉長橢圓形；果實向天，成熟時變紅、變褐色。耐旱及適應力強，較溼地為宜。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：果、根、莖。

主要成分：含果糖、葡萄糖、維他命等。

功　　效：果含葡萄糖。為祛風活血，治風濕病、白帶下消。

產　　地：新竹。

茸毛羊奶頭(樹)

編　　號：002

別　　名：天仙果

科　　名：桑科(Moraceae)

學　　名：*Ficus erecta Thunberg* var. *beacheyana*

生育特徵：多年生灌木植物，大葉茸毛長呈橢圓形；果向天，熟變紅、變褐色；白色乳液。習生於山坡地、路旁。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：果、根、莖。

主要成分：含葡萄糖。

功　　效：果含葡萄糖。有益氣活血通絡，祛風除濕，潤腸通便，解毒消腫。

產　　地：新竹。

編　　號：003

牛膝

別　　名：懷牛膝
科　　名：莧科(Amaranthaceae)
學　　名：*Achyranthes bideneata* Blume.
生育特徵：多年生草本植物，葉卵形，塊根肥大；花紅色，果有倒鉤。習生於平地、山坡地之陽光充足之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含生物鹼。
功　　效：補肝腎強筋骨、利尿通經、腰酸痛。
產　　地：新竹。

編　　號：004

土牛膝

別　　名：白土牛膝、牛膝、牛膝頭
　　　　　掇鼻草、白掇鼻草
科　　名：莧科(Amaranthaceae)
學　　名：*Achyranthes obeusifolia* Lam.
生育特徵：一年生草本植物，葉對生卵形；果有倒鉤。自生本省平地、山坡地、路旁及荒野地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：根含異牛膝固酮(isoinokosterone)。
功　　效：頭風、肝腎、解蛇傷。
產　　地：新竹。

紫莖牛膝

編　號：005
別　名：掇鼻草、牛蔡鼻
科　名：莧科(Amaranthaceae)
學　名：*Achyranthes rubrofusca* Wight.
生育特徵：多年生草本植物，葉對生卵形，形似土牛膝，枝條赤褐色；穗狀花序，開綠色小花，果小。根肥大。多自生長台灣山野有陽光之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含生物鹼。根含多醣體。
功　效：祛風利尿行血降火之效、治感冒、夢遺、消散、高血壓、瘰癧。
產　地：新竹。

滿天星

編　號：006
別　名：紅田烏、田邊草、田烏草
科　名：莧科(Amaranthaceae)
學　名：*Alternanthera sessilis* R. Br.
生育特徵：多年生草本植物，葉橢圓狀披針形，對生；全株紫紅色。頭狀花序，腋生，白色。多自生台灣平野，多見群生。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含生物鹼。
功　效：解熱、止血退癀、腎疾痢疾、吐血、洗無名腫毒。
產　地：新竹。

編　　號：007

節節花

別　　名：蓮子草、白花節節草

科　　名：莧科(Amaranthaceae)

學　　名：*Alternanthera nodiflora* R. BR.

生育特徵：多年生草本植物，葉成卵形，葡萄，各節均開花，花白色，謂節節花。

繁殖方法：實生繁殖法、扦插繁殖法

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：治腎疾、痢疾、吐血。

產　　地：新竹關西。

編　　號：008

青葙

別　　名：草決明

科　　名：莧科(Amaranthaceae)

學　　名：*Celosia argentea* L.

生育特徵：一年生草本植物，葉長披針形；穗狀花序，直立、花白或淡紅色。種子小，多自生於台灣中北部之地區。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：葉含生物鹼。

功　　效：煎汁洗眼、內服、清肝明目、強壯劑。

產　　地：臺灣。

編　　號：009

刺莧

別　　名：刺蒐、土莧菜、豬母菜、假莧菜

科　　名：莧科(Amaranthaceae)

學　　名：*Amaranthus spinosus* L.

生育特徵：一年生草本植物，葉卵形、分枝多拖葉變尾刺；開黃綠色單性花、穗狀花序。自生於台灣原野、路旁之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：全株含皂素。

功　　效：退熱通便、清血解毒、下消白帶淋濁、眼疾蛇傷、利尿、膽結石。

產　　地：臺灣各地。

編　　號：010

千日紅

別　　名：圓仔花

科　　名：莧科(Amaranthaceae)

學　　名：*Gomphrena globosa* L.

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，長披針形或卵形；頭狀花序，花紫紅色。種子小，褐色。喜生於山野之間，且含潮濕地為佳。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：花。

主要成分：種子含脂肪油。

功　　效：治哮喘極效。

產　　地：新竹。

編　號：011

雞冠花

別　名：雞公花
科　名：莧科(Amaranthaceae)
學　名：*Celosia cristata* L.
生育特徵：一年生草本植物，葉長披針形；開花如雞冠狀，有紅、黃、白各色；種子小，黑色。台灣各地庭院多有栽植，供觀賞。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：花穗、種子、莖、葉。
主要成分：種子含有脂肪油。
功　效：清熱、止血止痢、痔漏下血、赤白下痢、腸風瀉血。
產　地：新竹。

編　號：012

紫茉莉

別　名：煮飯花
科　名：紫茉莉科(Nyctaginaceae)
學　名：*Mirabilis jalapa* L.
生育特徵：多年生草本植物，分枝多，葉對生，倒卵形或心臟形；花為白、紅、黃，聚繖花序，頂生，果球形，黑色。台灣引種栽培於庭院供觀賞。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：根。
主要成分：根含胡盧巴鹼。
功　效：胃潰瘍、胃出血奇效、肺癰特效藥。
產　地：新竹。

編　號：013

商陸

別　名：見腫消、見腫清
牛大黃、野蘿蔔
金七娘、紅花倒水蓮

科　名：商陸科(Phytolaccaceae)

學　名：*Phytolacca acinosa* Roxb.

生育特徵：多年生草本植物，葉互生，橢圓形、卵形或披針形；總狀花序，腋生，花小，白色；果紫黑色。自生於台灣山地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根。

主要成分：根含商陸毒素、皂素。

功　效：利尿、治水腫。

產　地：新竹。

編　號：014

西洋商陸

別　名：美洲商陸、花商陸

科　名：商陸科(Phytolaccaceae)

學　名：*Phytolacca americana* L.

生育特徵：多年生草本植物，葉互生，橢圓形、卵形或披針形；總狀花序，腋生，花小，白色；果紫黑色。植株較商陸小。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根、種子、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：有毒，可消腫。根治白帶、風濕、並有催吐作用。種子利尿。葉解熱，並治腳氣、慢性腎臟炎、肋膜炎。外用可治無名腫毒及皮膚的寄生蟲病。腫毒、蛇頭疔。

產　地：美洲。

編　　號：015

松葉牡丹

別　　名：乞兒碗、六月雪
萬年草、金絲杜鵑
大花馬齒莧

科　　名：馬齒莧科(Portulacaceae)

學　　名：*Portulaca grandiflora* Hook.

生育特徵：多年生草本植物，莖帶紅色，葉螺旋狀排列，四季開花，頂生，呈紅、黃、白等。種子小。本省引種栽培於庭院供觀賞。

繁殖方法：實生法、扦插法繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含生物鹼。

功　　效：腫毒。

產　　地：新竹。

編　　號：016

馬齒莧



別　　名：豬母乳、長命菜、豬母草
豬母菜、五行草、馬蛇子菜

科　　名：馬齒莧科(Portulacaceae)

學　　名：*Portulaca oleracea* L.

生育特徵：多年生草本植物，葉互生，橢圓形、卵形，四季開花，黃色，蒴果，種子小。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：含生物鹼等。

功　　效：血瘀惡瘡、糖尿病、痢疾、腳氣水腫、痣、清熱解毒殺蟲、散血、消腫利尿、熱疾便血、癰腫疔瘡、赤白帶、急性關節炎、梅毒、淋濁、蛇傷。內服外敷治結核。

產　　地：台灣各地。

編　號：017

假人蔘

別　名：參仔草、參仔葉、參草
櫨蘭、土人參

科　名：馬齒莧科(Portulacaceae)

學　名：*Talinum crassifolium* Willd.

生育特徵：多年生草本植物，葉互生，卵形或倒披針形；圓錐花序、花紅色，蒴果小。自生本省山野，亦有栽培。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根、葉。

主要成分：葉含草鹼。

功　效：補藥、藥敷腫毒。

產　地：新竹。

編　號：018

魚腥草（蕺）

別　名：蕺、狗貼耳、臭臊草

科　名：三白草科(Saururaceae)

學　名：*Houttuynia cordata* Thunb.

生育特徵：多年生草本植物，葉互生，心臟形；穗狀花序，白色，花淡黃色；蒴果。自生於全省畦畔及低濕地，常見群落聚生。

繁殖方法：分枝法、扦插法繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：全株含精油。

功　效：散熱、解毒、消腫利尿、淋病、尿道炎、梅毒、子宮炎、水腫、胃癌、肺癰吐血、久瘧、化膿、中耳炎、肺膿瘍、可預防及治療狹心症的絞痛，外敷瘡腫、癬疥、痔瘡、香港腳、濕疹。

產　地：臺灣。

編　號：019

三白草

別　名：水茎根、水茎草
水木通、白舌骨
白面姑、水茎葉

科　名：三白草科(Saururaceae)

學　名：*Saururus chinensis* Baill.

生育特徵：多年生草本植物，葉互生，長橢圓形或卵形；六、七月頃梢葉 2、3 表面呈白色，與白葉相對，抽出穗狀花序。自生台灣山野潮濕或水邊地。

繁殖方法：分枝法、扦插法繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含生物鹼。

功　效：利尿、水腫、淋病、腳氣、消瘧破癖、除積聚消腫、清熱毒、淋濁。

產　地：新竹。

編　號：020

胡椒

科　名：胡椒(Piperaceae)

學　名：*Piper nigrum* L.

生育特徵：多年生草本植物，葉呈卵形、披針形或橢圓形，花自葉腋抽出，成穗狀，開白花，果熟時暗紅色。

繁殖方法：扦插繁殖法、實生繁殖法。

利用部位：果實。

主要成分：含生物鹼等。

功　效：果實，健胃、驅風、解熱、抗瘧劑。

產　地：屏東、高雄、新竹。

編　　號：021

防蚊胡椒

別　　名：蚊母樹、細葉蚊母樹

科　　名：金縷梅科
(Hamamelidaceae)

學　　名：*Distylium gracile* Nakaw

生育特徵：多年生草本植物，葉呈羽狀複葉，小葉長橢圓形，撥葉時發出胡椒味。

繁殖方法：扦插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含生物鹼等。

功　　效：全株可防蚊、消炎。

產　　地：台灣北、東部。

編　　號：022

風藤

別　　名：大風藤、太風行
大風陳、風陳、荖藤
真風藤、山荖葉、爬岩香

科　　名：胡椒科(Piperaceae)

學　　名：*Piper kadsura* Ohwi.

生育特徵：多年生草本植物，葉長圓形、圓形、長卵形；花黃色，腋生；漿果球形。自生台灣山野之蔓性木質，由節生氣根攀緣他物。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：藤根。

主要成分：葉含精油。

功　　效：祛風、風濕麻痺、根煮酒服治毒蛇傷、通經絡、關節疼痛。

產　　地：新竹。

編　號：023

山苧麻

別　名：青芋麻、山芋仔
山茶宰、山地麻根
野芋麻

科　名：蕁麻科(Urticaceae)

學　名：*Boehmeria frutescens* Thunb

生育特徵：多年生草本植物，葉卵形，互生；春季開花，腋生，果長橢圓形。自生於台灣山野，喜陽光足之地。

繁殖方法：分枝法、實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：含生物鹼。

功　效：消炎解毒、清血、散熱、肝炎。

產　地：新竹。

編　號：024

苧麻

別　名：真麻

科　名：蕁麻科(Urticaceae)

學　名：*Boehmeria nivea* Gaud.

生育特徵：多年生草本植物，葉卵形而尖，互生；花黃白色，果小。自生台灣山野或栽培於田園供纖維用。

繁殖方法：分枝法、實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：葉含苧麻酸。

功　效：活血止血、止渴、用黃酒煎服、清熱解毒、利尿安胎、淋病、尿血、瘡瘍腫毒。

產　地：新竹。

木苧麻

編　　號：025

別　　名：密花苧麻、密花木苧麻

科　　名：蕁麻科(Urticaceae)

學　　名：*Boehmeria densiflora* Hook. et Arn.

生育特徵：多年生常綠灌木植物，葉互生，長卵形或披針形；穗狀花序，果小。自生台灣各處河邊，崩壞地或荒廢地之群生地區。

繁殖方法：分枝法、實生法繁殖。

利用部位：根、莖、葉。

主要成分：含生物鹼。

功　　效：祛風、感冒、手風、月內風、止癢。

產　　地：新竹。

虎杖

編　　號：026

別　　名：土三七、川七 黃肉三七、七厘

科　　名：蓼科(Polygonaceae)

學　　名：*Polygonum cuspidatum* S. et. Z.

生育特徵：多年生草本灌木植物，葉互生，卵形或圓形；花白色至淡紅色，小花，圓錐花序；瘦果。自生台灣山野且陽光之地。

繁殖方法：分枝繁殖法。

利用部位：根。

主要成分：含虎杖苷、蓼苷、瀉素、葡萄糖。

功　　效：行血、鎮痛、跌打、小孩發育不良、盲腸炎、活血、利尿通經、瘀血腹脹痛、小便不適、月經困難，嫩梢葉敷跌打、刀傷。

產　　地：新竹。

編　　號：027

何首烏

別　　名：交藤、九真藤、紫烏藤

科　　名：蓼科(Polygonaceae)

學　　名：*Polygonum multiflorum* Thunb.

生育特徵：多年生草本植物，根肥大，葉互生，心臟形或卵形；白色小花，圓錐花序；瘦果。自生於台灣山野蔓性牽繞，且有陽光之地。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：塊根、莖、葉。

主要成分：含脂肪種類等。

功　　效：補肝腎、益精血、烏鬢髮、滋養強壯、緩瀉、對於衰老、病後恢復、陰虛久瘧、調營衛、寒熱、頸淋巴腺炎、遺精帶下、腰膝痠痛、痔瘻、寧心神、滋養衰弱、癰疽、除痹痛。

產　　地：台灣不生塊根，大陸者有肥大塊根。

編　　號：028

大甲草

別　　名：五虎下山、八卦癀
滿天星、下山虎
滿天草、藥虎草

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Euphorbia formosana* Hay.

生育特徵：多年生草本植物，葉互生或輪生，長披針形或線形；複聚繖花序，頂生或腋生，花黃色；蒴果。自生台灣全境海岸至平野之地或栽培。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根、莖。

主要成分：根含大甲草素。

功　　效：蛇傷、疥癬。

產　　地：新竹。

編　　號：029

大飛揚草



別　　名：大本乳仔草
神仙對坐草、羊仔乳
乳仔草

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Euphorbia hirta* L.

生育特徵：一年生草本植物，葉對生，長橢圓形或披針形；開黃褐色小花；蒴果。自生台灣原野路旁乾燥地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含生物鹼。

功　　效：治浮游虛火、牙齦腫痛、疥癩、解熱、消炎收斂、痢疾。

產　　地：新竹。

編　　號：030

霸王鞭

別　　名：火巷心、火巷

科　　名：大戟科
(Euphorbiaceae)

學　　名：*Euphorbia neriifolia* L.

生育特徵：多年生草本肉質小灌木植物，莖直立，葉小，倒卵狀長橢圓形，單生或對生。自外引種栽培，台灣現多以野生化。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：莖、葉。

主要成分：含生物鹼。

功　　效：採莖刮皮、浸水去乳汁，稱火巷心。清涼解毒、膚癢、梅毒、小兒臭頭。葉敷腫毒、水腫。

產　　地：新竹。

毛鉤藤

編　號：031

別　名：扛香藤、石岩楓
　　　　糞箕藤、鉤藤、桶交藤

科　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　名：*Mallotus repandus* (Willd) Muell-Arg.

生育特徵：多年生草常綠蔓性小喬木或小灌木植物，葉互生，卵形或橢圓形；總狀花序；蒴果。自生於台灣山麓、海岸之地。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：根、莖、葉。

主要成分：含生物鹼。

功　效：祛風、解熱、風濕、驅蛔蟲、止癢、殺蟲。

產　地：新竹。

白粗糠

編　號：032

別　名：粗糠柴、柿糊木
　　　　六稔仔、嘮哩仔
　　　　六檢仔、猴面樹、呂宋楸毛

科　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　名：*Mallotus philippinensis* (Lam) Muell-Arg.

生育特徵：多年生草本常綠小喬木或灌木植物，葉互生，橢圓形；花為穗狀花序，頂生；蒴果。自生於台灣山林或森林內有陽光之地。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。

利用部位：果。

主要成分：果含樹脂。

功　效：驅蛔蟲。

產　地：新竹。

猩猩木

編　號：033

別　名：聖誕紅、一品紅

科　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　名：*Euphorbia pulcherrima* Willd.

生育特徵：多年生常綠灌木植物，葉互生，葉橢圓形或廣披針形；頂端之包片於花期呈鮮紅色，花頂生，供盆景觀賞。喜生於熱帶、亞熱帶及台灣各地庭園普遍栽培，且陽光足之地。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：枝葉。

主要成分：含生物鹼。

功　效：治慢性內臟病。

產　地：新竹。

小飛揚草

編　號：034

別　名：百里香葉大戟、扁蓄、小本乳仔草、結尾仔草、乳草、扁蓄草、翻魂、紅乳草、乳仔草、鳥仔目草、過路蜈蚣、扁草、紅骨細本乳仔草

科　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　名：*Euphorbia thymifolia* L.

生育特徵：一年生匍匐性草本植物，葉小如瓜子肉，莖細如線，略帶暗紅色，白汁，葉對生，橢圓形之羽狀葉；花腋生；蒴果。自生於台灣原野、庭園、路旁之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含黃鹼酮及大戟脂素。

功　效：治小兒爛頭瘍、瘡滿耳目、膿水淋漓、消腫毒、消炎收斂、腸炎、痢疾。

產　地：新竹。

麻風樹

編　　號：035

別　　名：假白攬、麻楓樹
黃腫樹、巴豆、油樹樹
水漆、青桐木、臭油桐

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Jatropha curcas* L.

生育特徵：多年生小喬木或灌木植物，葉互生，大形淺裂葉圓形或廣心臟形；花腋生或頂生，聚繖花序，黃綠色小花；蒴果。喜生熱帶，台灣栽培、庭園且陽光足之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：種子。

主要成分：含脂肪油。

功　　效：瀉劑、吐劑、皮膚病。

產　　地：新竹。

葉下珠

編　　號：036

別　　名：十字珍珠草、白開夜閉
嬰婆究、朝開夜埋
珍珠草、珠仔草
紅骨豎叢珠仔草

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Phyllanthus urinaria* L.

生育特徵：一年生草本植物，直立，葉小，長橢圓形，互生或羽狀，葉腋間細小之紅褐色花；蒴果羅列於葉背，故名葉下珠。喜生於台灣全境山野之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含生物鹼。

功　　效：治小兒白病、諸疳瘦弱、兩目盲、眼疾、除瘴氣。

產　　地：新竹。

編　　號：037

蓖麻

別　　名：大麻子、紅篳蔴、篳蔴樹
篳蔴子、紅蓖麻
紅部麻、紅杜蓖子
蓖麻仁

科　　名：大戟科(Eupforbiaceae)

學　　名：*Ricinus communis* L.

生育特徵：一年生草本植物，葉互生，裂片卵形或狹卵形；花總狀花序；蒴果。喜生熱帶、亞熱帶，台灣引種栽培各地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：種子、葉、根、莖。

主要成分：含生物鹼。

功　　效：瀉劑、腹水癌、行血、止痛、解毒、盲腸炎、跌打傷、風傷、風濕、便毒、通便、腫毒、外痔、皮膚病、散風勝濕、腳氣風腫不仁。

產　　地：新竹。

編　　號：038

桂花

別　　名：木犀、九里香、崖桂

科　　名：木犀科(Oleaceae)

學　　名：*Osmanthus fragrans* Lour.

生育特徵：多年生灌木或小喬木植物，葉互生或對生，橢圓形、圓形或長橢圓狀披針形；花腋生，黃白色；核果。喜生於溫暖帶、亞熱帶且陽光之地。

繁殖方法：空中壓條繁殖法。

利用部位：花、枝葉。

主要成分：芳香油及脂肪油。

功　　效：花化痰生津，枝葉治牙、風濕、胃痛。

產　　地：新竹。

編　號：039

紅花八角

別　名：八角、八角仔、破龍樹

科　名：木蘭科(Magnoliaceae)

學　名：*Illicium arborescens* Hay.

生育特徵：多年生常綠小喬木植物，葉互生或對生，披針形、長圓披針形或倒卵形；花淡紅色，頂生或腋生；蓇葖果。喜生於山坡地、高山上。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：果實。

主要成分：果實含芳香油。

功　效：健胃。

產　地：新竹。

編　號：040

蘭嶼肉桂

科　名：樟科(Lauraceae)

學　名：*Cinnamomum myrianthum* Merr. (*Cinnamomum kotoense* Kan. et. Sas.)

生育特徵：多年生常綠小喬木植物，葉橢圓形；漿果小。喜生山坡地、山地且有陽光之地。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：樹皮及根皮。

主要成分：含精油。

功　效：芳香健胃劑。

產　地：蘭嶼。

編　號：041

南天竹

別　名：天竹、闌天竹、南天竺
南竺子、天竺子
科　名：小蘗科(Berberidaceae)
學　名：*Nandina domestica* Thunb.
生育特徵：多年生灌木植物，葉三回羽狀複葉，互生，小葉卵狀披針形；白花，圓錐花序；漿果，熟紅。喜生於庭園、山野或栽培，且陽光足之地。
繁殖方法：實生法、分枝繁殖法。
利用部位：種子、葉、根皮。
主要成分：小蘗鹼。
功　效：種子為著名鎮咳藥、治哮喘、百日咳；葉為強壯劑；根皮治腳氣。
產　地：新竹。

編　號：042

狹葉十大功勞

別　名：功勞葉、鐵八卦
科　名：小蘗科(Berberidaceae)
學　名：*Mahonia japonica* DC.
生育特徵：多年生灌木植物，小葉5~9片，狹披針形，刺狀鋸齒；總狀花序，黃色；漿果。喜生於山林荒地，目前多栽培平地且陽光足之地。
繁殖方法：實生法、扦插法繁殖。
利用部位：葉、莖、根。
主要成分：小蘗鹼。
功　效：葉為清涼滋養、強壯劑；根及莖治吐血、搗根汁含口內治牙痛、滋胃。
產　地：新竹。

編　　號：043

血藤

別　　名：烏血藤、大血藤
烏鴉腱

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Mucuna macrocarpa* Wall.

生育特徵：常綠大藤本，葉呈卵型，互生，羽狀複葉，小葉對生。花黃色，熟實暗紫色。

繁殖方法：實生法。

利用部位：莖。

主要成分：含生物鹼等。

功　　效：莖，舒筋活絡、活血調經。治風濕關節骨痛、月經不調。

產　　地：中國、台灣。

編　　號：044

紫陽花

別　　名：繡球花、八仙花
粉團花

科　　名：虎耳草科(Saxifragaceae)

學　　名：*Hydrangea hortensis* DC. var. *hordensis* Maxim.

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，卵形或廣卵形；繖房花序，密生或球形，淡紫碧色。喜生於庭園、田間且陽光足之地。

繁殖方法：分枝繁殖法。

利用部位：花及葉。

主要成分：八仙果素。

功　　效：治瘧疾特效，含八仙花酚。

產　　地：新竹。

編　　號：045

虎耳草

別　　名：錦耳草、石荷葉
老虎耳、金錢吊芙蓉
耳朵草、耳聾草
科　　名：虎耳草科(Saxifragaceae)
學　　名：*Saxifraga stolonifera* Meerb.
生育特徵：多年生草本植物，全草披毛茸，其匍匐枝著地，生根繁殖，葉腎臟形，圓形，多肉，其葉似虎之耳，故名；開白花；蒴果小。多喜生於台灣北部山地陰濕處。
繁殖方法：分株繁殖法。
利用部位：葉。
主要成分：含無機鹽類。
功　　效：葉汁治耳疾、中耳炎，鮮葉煮冰糖服治百日咳。
產　　地：新竹。

編　　號：046

魚藤(葡萄)

別　　名：台灣魚藤
科　　名：豆科（Leguminosae）
學　　名：*Derris trifoliata* Lour.
(Derris uliginosa
(Willd Benth.))
生育特徵：多年生藤本植物，葉呈羽狀複葉，小葉披針形，莖匍匐。
繁殖方法：扦插法。
利用部位：根。
主要成分：含魚藤精。
功　　效：為製農藥魚藤精乳劑之材料，利用其根。
產　　地：台灣。

魚藤(直立)

編　　號：047

別　　名：蘭嶼魚藤

科　　名：豆科（Leguminosae）

學　　名：*Derris oblonga* Benth (*Derris lianoides* Elm.)

生育特徵：多年生藤本植物，葉呈羽狀複葉，小葉披針形，莖直立狀。

繁殖方法：扦插法。

利用部位：根。

主要成分：含魚藤精。

功　　效：利用根製魚藤精乳劑之材料，可防治害蟲。

產　　地：蘭嶼、台灣。

含羞草

編　　號：048

別　　名：見誚草、見笑草 知羞草、呼喝草、誚草

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Mimosa pudica* L.

生育特徵：一年生匍匐性草本植物，全草密生毛茸，莖、葉有刺，葉互生，羽狀葉片二對；開淡紅色小花；莢果；觸葉即閉，故名。台灣各地山也均有分佈，忍性強，到處可生長。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含含羞草鹼。

功　　效：全草止痛、消腫，治眼熱作痛，尿毒有奇效；其含有含羞草鹼。亦為骨刺糖尿病、肝病藥；根治痢疾、哮喘、催吐；葉敷瘡腫、陰囊腫。

產　　地：新竹。

狗尾草

編　號：049

別　名：狐狸尾、狗尾、通連草
山貓尾、鼠尾草、通天草

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*(Uraria macrostachya* Wall.) *Uraria crinita* Desv.

生育特徵：多年生灌木草本植物，葉為奇數羽狀複葉，長橢圓形；5 月至 9 月由莖頂抽出大形花穗，密生，似狐狸尾故稱，花淡紫色；莢果。自生於台灣山野陽光足之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　效：治小兒五疳、瘢痧夾色，全草煎服；開脾利尿、殺蟲、健胃、主治脾疳、胃痛。

產　地：新竹。

大葉千斤拔

編　號：050

別　名：白馬屎、紅藥頭
紅豆草

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Moghania macrophylla* (willd) O. Kuntze.

生育特徵：多年生小灌木草本植物，葉為三出複葉，小葉長橢圓形；開白花；莢果。自生於台灣西部山野陽光足之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根。

主要成分：生物鹼。

功　效：全年掘根、洗淨、曬乾，主治風濕病、關節炎。

產　地：新竹。

洋蓍

編　　號：051
別　　名：鋸草、蜈蚣蒿
　　　　　一苗蒿、千葉蓍
科　　名：菊科(Compositae)
學　　名：*Achillea millefolium* L.
生育特徵：多年生草本植物，葉呈羽狀複葉，小葉針形，有如鋸草，或蜈蚣形。
繁殖方法：扦插法。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：全草治跌打扭傷、紅腫瘀痛、乳腺炎、外傷出血、急性乳腺炎。根治牙痛。
產　　地：歐洲、台灣。

珊瑚油桐

編　　號：052
科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)
學　　名：*Jatropha podagrica* Hooker
生育特徵：多年生草本肉質灌木植物，含白色乳汁，葉互生，圓型或近圓形；聚繖花序，花單性同株，紅色花；蒴果。喜生熱帶且陽光足之地。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：採根或全株。
主要成分：含生物鹼。
功　　效：拔腸解毒、消腫止痛，治毒蛇傷，癰瘡腫毒，血尿。
產　　地：新竹。

編　號：053

皀角

別　名：皀莢、皀刺
科　名：豆科(Leguminosae)
學　名：*Gleditsia sinensis* Lam.
生育特徵：多年生草本灌木植物，葉呈羽狀複葉，對生，小葉呈針形，莖枝有刺。單花，開黃色，熟成莢果。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：果莢、角刺、種子。
主要成分：生物鹼。
功　效：去皮，子研末治中風口斜。去皮、子、弦治風癬疥癩或皮膚痲木、死肌、頑皮癬等症。果莢可治便毒癰疽。皀刺治婦人乳癰、急性扁桃腺炎。
產　地：中國、新竹、恆春等地。

編　號：054

恆春皀角

別　名：皀刺
科　名：豆科(Leguuminosae)
學　名：*Gleditsia japonica* Mig
生育特徵：多年生草本灌木植物，葉呈羽狀複葉，對生，小葉呈針形，莖枝有蒺刺。單花，開黃色，熟時成莢果。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：皀角刺、種子。
主要成分：生物鹼。
功　效：採蒺刺、莢、種子入藥。去毒、消腫、腹內生瘡、乳癰、發汗、祛痰、鎮痛腸胃下血、軟堅化瘀。
產　地：中國、日本、台灣。

編　號：055

黃麻

別　名：絡麻、天紫蘇、洋麻
科　名：田麻科(Tiliaceae)
學　名：*Corchorus capsularis* L.
生育特徵：多年生草本灌木植物，葉呈長橢圓形，互生，全株呈黃色，頂生花，開黃色，蒴果。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：葉、根、種子。
主要成分：生物鹼。
功　效：根有利尿、解熱之效。葉為治血病要藥，治婦人血崩、屻血、腎臟炎及痢疾、腹痛等。
產　地：台灣。

編　號：056

黃花虱母子

別　名：黃花虱母球、黃花蒼耳黃花母、三角拌、下山虎虱母球、黃花地桃花
科　名：田麻科(Tiliaceae)
學　名：*Triumfetta bartramia* L.
生育特徵：多年生草本植物，葉菱形、卵形或心形銳頭，葉原具鈍齒，淺列三葉，具長板，形似虱母子；花黃色，聚繖花序；蒴果，球形。自生於台灣山野且有陽光之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含生物鹼。
功　效：全株為解毒清血、消炎鎮痛、祛風、降血壓，主治蛇傷、疔毒、遺精、風濕、胃氣痛等。
產　地：新竹。

落地生根

編　號：057

別　名：倒吊蓮、脚木草、生刀草
生刀藥、脚母草、大翻魂
大番魂、青刀草

科　名：景天科(Crassulaceae)

學　名：*Bryophyllum pinnatum* (Lam.)Kurz.

生育特徵：多年生草本植物，葉肉質，葉下部之葉為三出複葉，上半部者為單葉，對生，小葉橢圓形、圓形；圓錐花序，淡紅色；蒴果。喜自生於台灣山野且陽光足之地。

繁殖方法：葉插法繁殖法。

利用部位：莖、葉。

主要成分：含生物鹼。

功　效：散風清血、消腫毒、退癀熱，治癰疽熱毒、蜂巢癰疼痛、跌打、蛇傷、風熱、刀傷、主外用亦可服用，治水腫、肺炎。

產　地：新竹。

大返魂草

編　號：058

別　名：大番魂

科　名：景天科(Crassulaceae)

學　名：*Kalanchoe gracilis* Hance.

生育特徵：為多年生草本植物，直立，瘦長，根際葉三裂，頂葉片三深裂，裂片狹披針形；聚繖花序，頂生，開黃色花。喜自生台灣山野且陽光之地。

繁殖方法：葉插繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：含生物鹼。

功　效：葉可治跌打損傷、用水酒各半煎服，視為起死回生藥。全草搗汁服，治肺炎奇效。

產　地：新竹。

編　　號：059

台灣景天

別　　名：白豬母乳、白豬母菜
　　　　　石板蔡、台灣佛甲草
科　　名：景天科(Crassulaceae)
學　　名：*Sedum formosanum* Hay.
生育特徵：一年生或多年生草本植物，全株光滑無毛，葉長倒卵狀，狹橢圓形；花單生腋下，白色花；蒴果。習生於台灣全境，沿海沙灘、魚塭、池塘、水溝旁等地。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含皂苷。
功　　效：主治糖尿病。
產　　地：新竹。

編　　號：060

佛甲草

別　　名：黃花萬年草
　　　　　深山佛甲草
科　　名：景天科(Crassulaceae)
學　　名：*Sedum japonicum* Sieb.
生育特徵：多年生草本植物，莖短，匍匐性，上部及側枝直立或叢生狀，葉肉質，圓柱形，稍扁，紅色；開黃花。喜自生北部山野、路旁、岩石間之地。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含生物鹼。
功　　效：主治湯火灼傷、研貼之。
產　　地：新竹。

編　號：061

山葡萄

別　名：細本山葡萄、小本山葡萄

科　名：葡萄科(Vitaceae)

學　名：*Vitis thunbergii* S. et. Z. var. *adstricta*

生育特徵：多年生草本蔓藤植物，有卷鬚與葉對生、葉互生，寬卵形或三角狀卵形，三裂裂片三角形，亦有五裂，深裂或淺裂，裂片卵形或指狀，大小不一，亦有不分裂；花軸與葉對生，花為兩性或單性，穗狀花序，淡淺黃綠色；漿果。自生台灣全境平野至山麓灌叢中、荒地、草叢中散見，並見於低海拔山區。

繁殖方法：實生法、扦插法繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：果含醣類。

功　效：補腎、明目、解毒、祛風、補血主治眼疾、風濕、腎虧、亦治肺疾、乳癰、無名腫毒。其莖葉洗腫毒、其全株及果為製藥酒及飲料之材料。

產　地：新竹。

編　號：062

野牡丹

別　名：九螺花、埔筆仔
金榭榴、金石榴、王不留行

科　名：野牡丹科
(Melastomataceae)

學　名：*Melastoma candidum* D. Don.

生育特徵：多年生草本植物，葉呈卵形或長橢圓形，葉尖形，花開紫色花，果熟成石榴。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、幹、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：根、幹、葉為消炎、驅風、除濕、傷科、肺癰、風濕良藥。葉治胃病。

產　地：台灣。

編　　號：063

水丁香

別　　名：水丁香頭、金龍驏頭
　　　　　針銅射頭、劉寄奴
　　　　　水香蕉、水黃麻
科　　名：柳葉菜科(Qenotheraceae)
學　　名：*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven.
生育特徵：多年生草本植物，直立，分枝多，葉披針形；花腋生，黃色；蒴果。多喜自生於台灣原野水田邊陽光之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：根、葉。
主要成分：含生物鹼。
功　　效：解熱、利尿、降血壓，主治慢性腎臟炎、黃疸、肝炎，亦治高血壓、吐血、痢疾、牙痛、膚癢。
產　　地：新竹。

編　　號：064

過塘龍

別　　名：過江龍、水江龍
　　　　　過溝龍、水口龍、水龍
　　　　　水芥菜、過塘蛇
科　　名：柳葉菜科(Oenotheraceae)
學　　名：*Ludwigia peploides* Raven subsp stipulacea (Ohwi) Raven.
生育特徵：多年生草本植物，匍匐性，葉呈長橢圓形，開黃花，蒴果。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：莖為強壯劑，治喉痛、眼疾。
產　　地：台灣。

刺五加

編　號：065

別　名：五加、席氏五加
南五加皮

科　名：五加科(Araliaceae)

學　名：*Acanthopanax sieboldianus* Mak

植物特徵：多年生灌木狀植物，葉互生，葉為掌狀橢圓形，倒卵形至矩圓形，全株有刺。喜生於台灣全境，荒野地帶且有陽光之地。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：根、莖、皮。

主要成分：含五加皮素。

功　效：根莖皮即為五加皮，入藥酒為鎮痛強壯藥，治疝氣、腹痛及陰痿。皮含特有之芳香成份為 4-methoxysalicyl aldehyde 及脂肪油等。枝葉可製涼茶，治勞傷等。

產　地：新竹。

三葉五加

編　號：066

別　名：五加皮、香藤刺、貼肉刺

科　名：五加科(Araliaceae)

學　名：*Acanthopanax trifoliatus* (L) Merr.

植物特徵：多年生攀狀灌木植物，葉互生，葉為三裂葉，小葉片長卵形或長橢圓形，全株有刺。喜生於台灣山野荒地且有陽光地區。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：全 株 採 根、莖、皮，曬乾。

主要成分：含五加皮素。

功　效：有祛風止痛之功，治胃炎疼痛、跌打損傷、洗疥癩、治腫紅症、跌打傷敷瘡、煎水洗爛腳。枝葉為製涼茶，治勞傷。

產　地：新竹。

編　號：067

三島柴胡

科　名：繖形科(Umbelliferae)

學　名：*Bupleurum falcatum* L.

生育特徵：多年生草本植物，葉呈線形，開黃花。雙懸果，橢圓形。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根。

主要成分：皂素。

功　效：根為解熱、解毒、鎮痛、鎮痙藥。治瘧疾之惡寒戰慄及潮熱，除胸肋苦悶,對呼吸器疾患、肋膜炎、黃疸、胃腸病用之。

產　地：日本、台灣。

編　號：068

高氏柴胡

科　名：繖形科(Umbelliferae)

學　名：*Bupleurum Kaoi* Liu,chao et Chuang

生育特徵：多年生宿根草本植物，葉呈倒披針形互生，莖直立。繖形花序，開黃花，雙懸果。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根

主要成分：皂素。

功　效：根為解熱、解毒、鎮痛、鎮痙藥。治瘧疾之惡寒戰慄及潮熱，除胸肋苦悶，對呼吸器疾患、肋膜炎、黃疸、胃腸病用之。

產　地：台灣。

老公根

編　號：069

別　　名：含殼仔草、蚶殼草
　　　　　含殼草、蚋仔草

科　　名：繖形科(Umbelliferae)

學　　名：*Centella asiatica* Urb.

植物特徵：多年生草本植物，匍匐地上，著地生根，葉腎臟形；開淡紫紅色小花，腋生，小繖形花序；雙懸果。自生於台灣田野、路旁、至高山等地區。

繁殖方法：分株繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含配醣體、皂素、及生物鹼。

功　　效：祛風、固腸、明目、清暑。主治腹痛、痢疾、青盲內障、高血壓、白濁、散赤熱毒，跌打損傷、解蛇毒並治疔解毒。含有 hydrocotyline 成份。全草含亞洲酸（asiatic acid）等五種抗生素，對結核菌及痲瘋有抗菌作用。

產　　地：新竹。

長春花(紅)

編　號：070

別　　名：四時春、日日春

科　　名：夾竹桃科(Apocyaceae)

學　　名：*Catharanthus roseus* (L.) G. Don

生育特徵：多年生草本植物，葉長橢圓形；花紅色，蓇葖果。自生於台灣山野、荒地有陽光地區。現為栽培種。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：止痛消炎、安眠、健胃、通便、利尿、主治痢疾、胃痛、腹痛、癌症(血癌、子宮癌)。

產　　地：新竹。

編　　號：071

長春花(白)

別　　名：時春、日日春
白日日春花、白墓花
科　　名：夾竹桃科(Apocyaceae)
學　　名：*Catharanthus roseus* (L.) Don CV Albus.
生育特徵：多年生草本植物，葉對生，長橢圓形；開白色花，腋生；結蓇葖果。自生於台灣山野、陽光之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：生物鹼。
功　　效：止痛、消炎、安眠、健胃、通便利尿。主治痢疾、胃痛、腹痛、癌症。採白花治咳嗽、子宮癌、血癌。
產　　地：新竹。

編　　號：072

白水木

別　　名：水草、山草、山埔姜
科　　名：紫草科(Boraginaceae)
學　　名：*Messerschmidia argentea* (Linn.) John.
生育特徵：多年生灌木狀植物，葉互生，輪生狀，倒卵形或匙形；聚繖花序，花小白色；核果。自生台灣恆春、蘭嶼、綠島、小琉球等地沿海岸散生或群生。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含生物鹼。
功　　效：鮮葉汁解魚貝中毒，全草治風濕骨痛。
產　　地：新竹。

海州常山

編　　號：073

別　　名：臭芙蓉、芙蓉根
八角梧桐、秋葉
地梧桐、臭牡丹
泡花桐、臭梧桐、臭木

科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)

學　　名：*Clerodendrum trichotomum* Thunb

生育特徵：多年生灌木狀或小喬木，葉對生，倒卵形；開白花；核果。自生於台灣山野陽光之地。

繁殖方法：分株或扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：治高血壓。

產　　地：新竹。

長穗木

編　　號：074

別　　名：久佳草、耳鉤草
馬鞭草、玉龍鞭
假馬鞭、木馬鞭

科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)

學　　名：*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，為橢圓形或闊卵圓形；穗狀花序，花為紫藍色花；蒴果。自生於台灣山野、荒地且陽光足之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：治肝病、通經活血、風濕、痢疾、外感發熱。嫩葉搗汁，滴耳內治耳疾。

產　　地：新竹。

編　　號：075

化石樹

別　　名：化石葉、大號化石草
圓葉化石草、化石草
南洋草、爪哇大青

科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)

學　　名：*Clerodendrum calamitosum* L.

生育特徵：多年生灌木植物，葉對生，潤卵形或橢圓形；花白色；蒴果。喜自生於台灣山野及荒山之地且有陽光處。

繁殖方法：種子、分株及扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草為強力利尿劑，常與貓鬚草合用，主治膀胱結石、膽結石、腎結石。

產　　地：新竹。

編　　號：076

白龍船花

別　　名：白龍船、白癲花

科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)

學　　名：*Clerodendrum paniculatum* var. *albiflorum* Hemsl

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，橢圓形；開白花；蒴果。自生於台灣山野且有陽光之地。

繁殖方法：分株繁殖法。

利用部位：根幹、葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根幹調經理帶，治月經不調、赤白帶、腎虧、下消、淋病，葉敷腫毒。

產　　地：新竹。

編　號：077

羅勒

別　名：零陵草、千層塔
九層塔、佩蘭、菜板草
零陵香、省頭草
光明子、家佩蘭、藥佩蘭

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Ocimum basilicum* L.

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，披針形；花紫白色；蒴果。喜生於台灣原野且有陽光之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：精油、皂素。

功　效：全草為婦科良藥，使分娩前後血行良好，治胃痙攣、腎臟病、跌打。種子為眼科藥、避孕藥。全草含精油。

產　地：新竹。

編　號：078

貓鬚草

別　名：化石草、腎茶
腰只草、尖葉化石草

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Orthosiphon aristatus* (BL) Mig.

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，葉呈倒披針細鋸齒狀；花紫色；蒴果。喜生於台灣山野且潮濕帶陽光之地。

繁殖方法：扦插、分株繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼、貓鬚草苷。

功　效：全草鮮用，為聞名全球之利尿劑。主治腎臟炎、腎結石、膽結石、肝炎、高血壓。常與化石樹合用良效。葉含貓鬚草苷(Orthosiphonin)，生物鹼及鉀鹽。

產　地：新竹。

編　　號：079

草石蠶

別　　名：蝸兒草、地蠶、土草蟲
　　　　　草冬蟲

科　　名：唇形科(Labiatae)

學　　名：*Stachys sieboldi* Mig.

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，卵形，根生肥大塊根如蟲形，似蠶，故稱。喜生於陰濕且有陽光地。

繁殖方法：分株、扦插繁殖法。

利用部位：根、葉、塊、根。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根治心痛，為消腫止痛。

產　　地：新竹。

編　　號：080

半枝蓮

別　　名：向天盞、乞丐碗
　　　　　昨葉荷草、瓦草
　　　　　牙刷草、田莖草。

科　　名：唇形科(Labiatae)

學　　名：*Scutellaria rivularis* wall.

生育特徵：一年生草本植物，莖四方形，對生，披針形，總狀花序，開紫藍色，排在一邊，謂半枝蓮。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼、黃酮苷。

功　　效：全草鮮用或晒乾，有活血行氣、散風理咳、解熱止痛之功。主治跌打、驚風、肺炎、喉痛、腹痛、胎毒、腸炎、盲腸炎。敷癰、疔、蛇傷、腸癌、胃癌、子宮癌。

產　　地：台灣、新竹。

土荊芥

編　號：081

別　名：七層塔草、賴斷頭草
假蘇、蛤蟆草

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Salvia plebeia* R Br.

生育特徵：二年生草本植物，葉對生，呈長圓形或披針形，邊緣有鋸齒，花頂生或腋生，穗狀花序，花紫色，小堅果。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼、黃酮類化合物等。

功　效：種子治疝痛、淋病、月經過多。全草治腹脹痛、清熱、涼血、敗毒、消腫痔漏、腸風、肝炎、腫瘍。莖及葉含生物鹼。

產　地：虎尾、新竹。

白冇骨消

編　號：082

別　名：頭花甲走馬風、冇廣麻
丸仔草、山丹花

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Hyptis captiata* Jacq.

生育特徵：一年生草本植物，葉對生，長披針形或長卵橢圓形；開白色花；球果。喜生陰濕且有陽光之地。

繁殖方法：分株、扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　效：解熱、行血、治感冒、痲疹、氣喘、乳癰、腹痛、中暑、肺疾、淋疾。葉搗敷癤疽。

產　地：新竹。

編　　號：083

仙草

別　　名：仙草凍、涼粉草
仙草乾、仙草干
科　　名：唇形科(Labiatae)
學　　名：*Mesona chinensis* Benth
生育特徵：多年生草本植物，葉對生，卵形；開淺紫色花；蒴果。喜生於陰濕且有陽光之地。
繁殖方法：實生法、營養繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：生物鹼及膠質。
功　　效：全草治花柳入骨、清熱涼血、降血壓、主治高血壓、淋病及腎臟病。亦為仙草水之原料，藥膳之仙草雞等。
產　　地：新竹。



編　　號：084

香茹

別　　名：香薷
科　　名：唇形科(Labiatae)
學　　名：*Elsholtzia ciliata* Hylander.
生育特徵：一年生草本植物，全株被細毛，有香氣，葉對生，長披針形，花頂生，穗狀花序，淡紫色，小堅果球形。
繁殖方法：種子及分株或扦插繁殖
利用部位：全草
主要成分：含精油、香薷酮(elscholtziaketone)，倍半萜烯(sesquiterpene)1％。
功　　效：全草發汗解暑、利尿行水。
主治感冒、腹痛吐瀉、水腫、急性胃炎。
產　　地：中國、澎湖、新竹。



鼠尾癀

編　號：085

別　名：白花草、虎咬草
白花仔草

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Leucas mollissima* Wall. var. *chinensis* Benth

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，卵形；開紫白色花；蒴果。喜生於陰濕處有陽光之地。

繁殖方法：實生、扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草為退癀之著名藥材，五癀湯之主藥，葉外敷腫毒、疔瘡、毒蛇咬傷。

產　地：新竹。

貢杞(長葉貢杞)

編　號：086

別　名：寧夏枸杞、枸杞子
地仙花、地骨友苦杞

科　名：茄科(Solanaceae)

學　名：*Lycium halimifolium* Miller

生育特徵：多年生灌木狀植物，葉互生，長披針形；開紫色花；紅色果。喜生於山野、平地或乾燥之地且有陽光者。

繁殖方法：種子、扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　效：子為強壯劑，治糖尿病、肺結核、止咳、解渴。果含玉米黃素(zeaxanthin)、betaine、physalien；根皮全年採為強壯解熱藥。含 betaine、sitosterol、linolic acid。葉為解熱、止渴、去諸瘍之腫脹。鮮枝葉燉豬肝；治眼睛。含維生素 C，芸香苷，betaine，β-sitosterol-glucoside。根及幹解毒消炎，治風濕。根、莖、葉含生物鹼。

產　地：新竹。

編　號：087

野刺茄

別　名：小顛茄、小羊花、爬山虎

科　名：茄科(Solanaceae)

學　名：*Solanum aculeatissimum* Jack.

生育特徵：多年生草本灌木狀植物，葉互生，略帶三角裂葉皺波形上下有刺；開紫色花；果熟黃。喜生於台灣平野、路旁、荒山且有陽光之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：葉、根、種子、莖。

主要成分：生物鹼。

功　效：莖、葉治下疳、梅毒。根治跌打將死、酒煎服；又為祛痰、解熱、利尿妙藥。並治痙攣性咳嗽、哮喘及胸痛等，亦為追風定痛。種子治牙痛、水蠱滯症，民間用肝炎殊效。含生物鹼(solasodine)果實含(solanidine)。

產　地：新竹。

編　號：088

曼陀羅(白花)

別　名：白曼陀羅、南洋金花
曼陀羅花、山茄子
洋金花、鳳茄花
保險子(雲南白藥之主藥)
大顛茄、風茄花

科　名：茄科(Solanaceae)

學　名：*Datura metel* L.

生育特徵：一年生或越年生草本灌木狀植物，葉互生，橢圓羽狀淺裂；開白色花；果球形，表面有刺。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根、葉、果實及種子、花。

主要成分：生物鹼。

功　效：花味辛，性溫，有毒，能止痛、通關利竅、安眠、癲狂。亦為麻醉止痛、風濕、平喘咳、鎮咳、鎮痛、催眠。內服止一切疼痛。葉外科用，搗敷止痛。煎湯洗，治風濕痛，寒濕腳氣，內服或揉碎作煙吸，治哮喘、劇烈咳喘。種子行血、祛風寒、濕痺、瘻癧腫脹、撲損疼痛。子含莨菪鹼(hyoscyamine)0.02 %，葉含 hyoscine0.24 %，花含莨菪鹼(hyoscyamine)0.04 %，atropine 等，種子為氫溴酸莨菪鹼之原料。根、葉、果實及種子含 6 種生物鹼。

產　地：新竹。

編　　號：089

枸杞

別　　名：枸繼子、枸棘子
甜菜子、地仙花
枸杞菜、土杞子、土枸杞

科　　名：茄科(Solanaceae)

學　　名：*Lycium chinense* Miller

生育特徵：多年生草本灌木狀植物，葉互生，長橢圓形；開紫色花；果熟紅。喜生於平野、路旁、荒山，且有陽光之地。

繁殖方法：實生、扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：果為強壯劑、治糖尿病、肺結核、止咳解渴。根皮為強壯解熱藥。枝葉治眼疾。根及幹為解毒消炎，治風濕。

產　　地：新竹、中國。

編　　號：090

黃水茄

科　　名：茄科(Solanraceae)

學　　名：*Solanum incanum* L.

生育特徵：多年生草本灌木植物，葉互生，卵形至長圓狀卵形。花淡紫色，果漿果，橢圓形，黃色。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草及果實為鎮痛消炎,尤對肝炎特效。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：091

山煙草

別　名：生毛將軍、山蕃仔煙
土煙、蚊仔煙、山煙草葉
大煙仔葉、假煙葉

科　名：茄科(Solanraceae)

學　名：*Solanum verbascifolium* L.

生育特徵：多年生灌木至小喬木 ，單葉互生，有時對生，葉大厚，形似茄葉。花多，白色。被聚繖形花序，頂生或側生，漿果，黃褐色。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　效：葉為治風濕腳痛、腰部神經痛、產婦壯強劑。根、幹為祛風、解熱、除濕、強壯、止痢。治風濕病、傷風感冒。皮及葉含 2 種生物鹼。

產　地：台灣、新竹。

編　號：092

通泉草

別　名：六角定經草、六角金英
白子菜

科　名：玄參科
(Scrophulariaceae)

學　名：*Mazus miguelii* makino.

生育特徵：一年生草本，葉互生或對生，倒卵形或匙形。總狀花序，頂生，白花或淡紫色，蒴果。



繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草治婦女月經不調、蛇毒咬傷、偏頭痛、消化不良。

產　地：台灣、新竹。

編　號：093

田字草

別　名：蘋、田葉菜、田眼藥、田葉草、四賢草、水鹽酸

科　名：蘋科(Marsileaceae)

學　名：*Marsilea minuta* L.

生育特徵：多年生草本蕨類，葉對生，十字形，頂生小葉四片，倒三角形至田字形；孢子囊果生葉柄基部。喜生於陰濕且有陽光之地。

繁殖方法：分株繁殖法、扦插繁殖法。

利用部位：根、莖、葉。

主要成分：含生物鹼。

功　效：為治消渴、吐血、風火赤眼、腎炎、腳腫、肝炎、婦女陰道紅腫、熱瘡、腫毒、疔瘡、外傷腰痛，毒蛇傷。

產　地：新竹。

編　號：094

九頭獅子草

別　名：肺痨草、蛇舌草

科　名：爵床科(Acanthaceae)

學　名：*Dicliptera japonica* Makino (*Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek.

生育特徵：多年生草本植物，莖四稜形，葉對生，披針形，全緣。聚繖花序，淡紅紫色，蒴果。喜生於山野、荒山且有陽光之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：葉汁塗頭痛、腹痛、治肝病。

產　地：新竹。

編　號：095

紅子莢迷

別　　名：紅子仔、臭腳樹
　　　　　紅雞腿

科　　名：忍冬科(Coprifolioceae)

學　　名：*Viburnum luzonicum* var. *formosanum* Rehd.

生育特徵：多年生落葉灌木植物，葉對生，闊卵形；聚繖花序，頂生。核果，果熟時紅色。喜生於原野、荒山且有陽光之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根、幹。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根、幹為驅風除濕、轉骨壯陽、清涼解毒。主治小兒發育不良、風傷、夢遺。

產　　地：新竹。

編　號：096

冇骨消

別　　名：冇骨消根、七葉根

科　　名：忍冬科(Coprifolioceae)

學　　名：*Sambucus formosana* Nakai.

生育特徵：多年生草本植物，莖直立，葉對生，奇數羽狀複葉，小葉廣披針形，聚繖花序，花白色。

繁殖方法：實生繁殖法及分株或扦插繁殖。

利用部位：根、莖、葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採用根、莖、葉治淋病、清涼解毒。主治癰疽、腫毒。

產　　地：新竹。

白花蛇舌草

編　號：097
別　名：珠仔草、蛇舌癀、蛇舌草
科　名：茜草科(Rubiacceae)
學　名：*Hedyotis diffusa* Willd
生育特徵：一年生草本植物，葉對生，線形至線狀披針形；開白花；蒴果。喜生於陰濕且有陽光之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：生物鹼。
功　效：全草為清熱散瘀、消癰解毒，主治亞急性或慢性闌尾炎、瘡疥、癰疽、腹部臟暑生結塊均有效。盲腸炎有特效，及其他腸病、腸癌、癌症殊效，亦為解熱、殺蟲、健胃。
產　地：新竹。

茅瓜

編　號：098
別　名：老鼠擔冬瓜、小天花。
科　名：葫蘆科(Cucurbitaceae)
學　名：*Solena heterophylla* Lour.
生育特徵：多年生常綠藤本，葉互生，呈三角狀披針形，三角狀卵形，成 3-5 裂片，花繖房花序，黃色。果橢圓形，熟時紅色。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：根。
主要成分：生物鹼。
功　效：根敷惡瘡，治酒疸、消小腸氣發、益婦人血，為括樓原料之一。
產　地：新竹。

王瓜

編　　號：099

別　　名：天花粉、師古草
野冬瓜、鴨旦袋

科　　名：葫蘆科(Cucurbitaceae)

學　　名：*Trichosanthes cucumeroides* (Ser.) Maxim.

生育特徵：多年生宿根藤本植物，葉呈心形，邊緣鋸齒，莖蔓有卷鬚。花自腋生，開白花，漿果熟轉紅，皮有條紋。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根、子。

主要成分：生物鹼。

功　　效：王瓜根催乳、通經。治黃疸、下血。王瓜子為祛痰、鎮嘔、收斂劑。治肺痿縮、吐血、腸出血、腸炎及赤白痢等。

產　　地：新竹。

半邊蓮

編　　號：100

別　　名：鐮刀仔草、水仙花草

科　　名：桔梗科(Companulaceae)

學　　名：*Lobelia chinensis* Lour

生育特徵：多年生草本植物，葉互生，狹披針形至線形；開淺白紫色花；蒴果。喜生於潮濕且有陽光之地。

繁殖方法：種子繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含生物鹼。

功　　效：治蛇傷、痢疾、刀傷、血吸蟲病、腹水，敷惡瘡、火瘡、消腫散毒。

產　　地：新竹。

山防風

編　　號：101

別　　名：禹州漏盧

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Echinops latifolius* Tausch

生育特徵：一年生或越年生草本植物，葉互生，羽狀深裂葉，有刺；開藍色花，球形；瘦果。喜自生台灣山野且有陽光之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：排膿止血、生肌、下乳、清熱、解毒、主治瘡痔疾、乳癰、瘰癧、癰疽、發背、根保肝。

產　　地：新竹。

黃花蜜菜

編　　號：102

別　　名：蟛蜞菊、寒丹草

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Wedelia chinensis* Merr

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，線狀長橢圓形倒披針形或長橢圓形；頭狀花序，腋生，開黃花；瘦果。喜生於台灣平野至海濱之濕潤地。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：清熱解毒、入涼茶。

產　　地：新竹。

鱧腸

編　　號：103

別　　名：細葉枯力仔、田烏草
烏田草、烏田烏、田烏仔草
旱蓮草、白田烏草、汗蓮草
旱連草、佩蘭、墨旱蓮、墨草
墨斗草、野水鳳仙、墨汁旱蓮草

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Eclipta prostrata* L.

生育特徵：一年生草本植物，枝葉搗碎汁變黑色，葉對生，披針形，頭狀花序，腋生或頂生，花白色，瘦果。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全草、種子。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草補腎陰、止血痢、烏鬚髮、固齒牙、滋養性收斂劑。主治吐血、衄血、腸出血、外傷出血、牙齒不固。

產　　地：新竹。

紫背草

編　　號：104

別　　名：葉下紅

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Emilia sonchifolia* (L.) DC

生育特徵：一年生草本植物，葉互生，卵形或琴形，葉面深綠色，背面紫紅色；頭狀花序筒形，紅色花；瘦果。自生本省山野田園陽光之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：解熱、消炎、外敷癰疽、消腫退癀。

產　　地：新竹。

蒼耳

編　　號：105

別　　名：枲耳、蒼耳子、蒼耳根、蒼耳頭、羊帶來、蒼耳葉

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Xanthium Strumarium* L.

生育特徵：一年生草本植物，葉互生，披針形，頭狀花序，頂生，腋生，淡綠色，果倒卵形，有小鉤刺。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：果實為發汗、利尿、排毒、鎮痙鎮痛、肌肉神經痲痺、梅毒、痲風、關節痛、水腫。根及幹為感冒、瘰癧、扁桃腺炎、大痲瘋、癰疽疔毒。全草為發汗、散風寒。主治中風、痲瘋、傷寒頭痛、耳瘤、敷癰疽發背、無頭惡瘡、疔癧風癢。

產　　地：台灣。

下田菊

編　　號：106

別　　名：痲芝糊、四葉紫蘇竹節黃

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Adenostemma lavenia* (L.)O. kuntze

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，圓狀披針形，開白花，瘦果。

繁殖方法：實生繁殖法，分枝繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：涼血、消腫、排膿之效。主治肺癰、肋膜積水、肺炎、肋膜炎、肝炎、急性傳染性肝炎、感冒咳嗽、風濕關節疼痛。

產　　地：台灣。

編　　號：107

大薊

別　　名：薊、大薊根

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Cirsium japonicum* DC.

生育特徵：多年生宿根草本植物，葉互生，根生葉倒卵狀長橢圓形，羽狀裂葉，有刺；頭狀花序，開紫紅色。自生平野、荒山濕潤且有陽光之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草破血行瘀、涼血、止血，主治吐血。

產　　地：新竹。

編　　號：108

西洋蒲公英

別　　名：蒲公英

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Taraxacum officinale* Weber.

生育特徵：多年生草本植物，根大，葉根生，葉呈場橢圓形，葉緣深列為羽狀，花梗由根伸出，頭狀花序，花黃色，瘦果。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根或全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根或全草為健胃劑。

產　　地：歐洲、新竹。

台灣蒲公英

編　號：109
別　名：蒲公英、馬齒草
科　名：菊科(Compositae)
學　名：*Taraxacum formosanum* kitam
生育特徵：多年生宿根草本植物，根莖短，全株含白色乳汁，葉叢生根莖上、密集，葉倒披針形，全緣或逆白羽狀缺刻及羽狀深裂，裂片大小、形狀不一，輪生；花單生，多數頭狀花序，黃色；瘦果。本省固有，自生於荒野、山野且有陽光之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：生物鹼。
功　效：治乳癰、腫毒。
產　地：新竹、後龍、淡水。

七葉蘭

編　號：110
別　名：桔香草、香林投
印度神草、螺旋松樹
科　名：露兒樹科(Pandanaceae)
學　名：*Pandanus odorus* Ridl.
生育特徵：多年生草本常綠灌木植物，葉密集螺旋狀，線狀披針形，揉之有芋味香氣。喜生於平地、路旁及住家附近之潮濕且有陽光之地。
繁殖方法：分株繁殖法。
利用部位：葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：利用鮮葉具有清涼解渴、促進新陳代謝之效，且具有芋頭香味，可製成飲料，為清香、潤喉、甘美。
產　地：新竹。

淡竹葉

編　　號：111

別　　名：淡竹、碎骨子、淡竹葉根
淡竹葉球根、竹葉麥冬

科　　名：禾本科(Gramineae)

學　　名：*Lophatherum gracile* Brongn.

生育特徵：多年生草本，葉似竹葉，披針形，抽穗，結穎果，根大有白質塊根，形似麥冬。

繁殖方法：分枝繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼及碳水化合物。

功　　效：全草為清涼、解熱、利尿劑。治熱病口渴、小便澀通、煩熱不寐。又治牙齦腫痛、口腔炎。塊根解熱利尿、潤肺清胃、墮胎、催生。主治肺病咳嗽、水腫。

產　　地：南投、新竹。

香蒲

編　　號：112

別　　名：水蠟燭、蒲黃
東方香蒲、寬葉菖蒲

科　　名：香蒲科(Typhaceaae)

學　　名：*Typha orientalis* presl

生育特徵：多年生草本，莖匍匐橫走，葉條形或狹線形。花單生，穗狀花序，頂生，圓柱形，似蠟燭。

繁殖方法：分株繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草治小便不利、關節上下不通、膈覺有所礙、欲升不升、欲降不降、升降不行、飲食不下、大便不出。治產後婦乳並癰、熱搗敷腫大。並葉煎汁飲之亦得。

產　　地：新竹。

柚葉藤

編　　號：113

別　　名：石柑、青風藤

科　　名：天南星科(Araceae)

學　　名：*Pothos chinensis* Merr.

生育特徵：多年生蔓性藤植物，葉對側互生，柄具翼，長卵形，葉片短矩圓形或披針形；肉穗花序，白色花；漿果熟時深紅色。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：精油。

功　　效：全草有理氣止痛、清熱、解毒、消食之效。治心胃氣痛、風濕骨痛、疝氣、腳氣、耳瘡。

產　　地：台灣新竹。

蒟蒻

編　　號：114

別　　名：魔芋

科　　名：天南星科（Araceae）

學　　名：*Amorphophalus koniac* K.koch

生育特徵：多年生宿根草本，葉互生，掌狀深裂，裂片披針形。

繁殖方法：塊莖栽培繁殖法。

利用部位：球莖。

主要成分：生物鹼。

功　　效：球莖為利尿、緩和藥、糊料、供食用。

產　　地：南亞原產中國、台灣、日本栽培。

編　號：115

百部

別　名：蔓生百部
科　名：百部科(Stemonaceae)
學　名：*Stemona japonica* Miquel
生育特徵：多年生蔓生植物，葉對生，廣披針形；根生塊根；開紫色花。生於台灣中北部中低海拔繞於樹幹上。
繁殖方法：分株繁殖法。
利用部位：塊根。
主要成分：生物鹼。
功　效：塊根為鎮咳、驅蟲。
原 產 地：新竹。

編　號：116

台灣油點草

別　名：竹葉草、石溪蕉
科　名：百合科(Liliaceae)
學　名：*Tricyrtis formosana* Baker
生育特徵：多年生草本植物，葉互生，形似竹葉；總狀花序，開紫紅色花；蒴果。喜生於陰濕處及水溝邊之地。
繁殖方法：扦插、實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：生物鹼。
功　效：全草消腫退癀，主治喉痛、扁桃腺炎、喉哦。
產　地：新竹。

編　號：117

蘆薈

別　名：訥會、象胆、奴會
勞偉、油蔥、羅幃草

科　名：百合科(Liliaceae)

學　名：*Aloe barbadensis* var. *chinensis* Berger

生育特徵：多年生草本植物，具短莖，葉排列呈蓮座狀，肥厚多汁，邊緣疏生刺；總狀花序，從葉叢中抽出，為黃色之小花。自生於台灣平地山野且有陽光之地區。

繁殖方法：分株繁殖法。

利用部位：葉、花。

主要成分：生物鹼。

功　效：葉片為瀉藥、健胃藥。火傷、痔瘡、肝病。花浸酒服治內傷吐血。

產　地：新竹。

編　號：118

麥門冬

別　名：大葉麥門冬

科　名：百合科(Liliaceae)

學　名：*Liriope spicata* Lour.

生育特徵：多年生草本植物，根生小塊根，莖短，葉基生成叢，葉條形；穗狀花序，開淡紫色小花；漿果。喜生於山野較陰濕且陽光之地。

繁殖方法：分株繁殖法。

利用部位：全株及塊根。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草及塊根為消炎、滋養強壯、有鎮咳、祛痰、強心，主治肺熱咳嗽、心熱煩渴、利尿、催乳。

產　地：新竹。

編　號：119

黃花萱草

別　名：萱草、藜蘆
金針花、金針根
科　名：百合科(Liliaceae)
學　名：*Hemerocallis flava* L.
生育特徵：多年生草本植物，葉互生，長條形，輪生；葉腋抽出花梗，開金黃色花。喜生於台灣平地、山野等地潮濕處。
繁殖方法：分株繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：生物鹼。
功　效：全草為利尿止血、消腫。治血吸蟲病、結石病、肝病。花及芽心等供食用。
產　地：新竹。

編　號：120

百合

別　名：台灣百合、山蒜頭
兜鈴、本兜鈴、本紫菀
科　名：百合科(Liliaceae)
學　名：*Lilium formosanum* Wall
生育特徵：多年生宿根草本植物，葉互生，披針形；開白色花。自生於台灣荒山、平地散生。
繁殖方法：鱗片插植繁殖法。
利用部位：鱗莖、種子、根。
主要成分：生物鹼。
功　效：鱗莖為清涼解毒、止咳，主治肺炎、咳嗽、氣管支炎、亦供食用。種子為固肺、鎮咳。根為固肺鎮咳，主治熱咳、喉頭痛、咽喉卡結。
產　地：新竹。

仙茅（大本）

編　　號：121

別　　名：大葉仙茅、大地棕根
松蘭、竹靈芝、船仔草

科　　名：石蒜科(Amaryllidaceae)

學　　名：*Curculigo capitulata*
(Lour) O. ktze.

生育特徵：多年生草本植物，根莖塊狀。葉叢生基部，葉呈矩圓狀披針形，頭狀花序，花黃色，蒴果。

繁殖方法：分株繁殖法。

利用部位：根、莖。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根莖稱大地棕根、補虛、祛風濕、治虛勞咳嗽、風濕病。

產　　地：新竹。

仙茅（小本）

編　　號：122

別　　名：獨角仙茅、蟠龍草

科　　名：石蒜科(Amaryllidaceae)

學　　名：*Curculigo orchioides*
Gaertn

生育特徵：多年生草本植物，根肥大，葉互生，成披針形，葉緣有齒；花自葉腋生；開黃色小花。喜生於山林陰濕處且有陽光之地。

繁殖方法：分株繁殖法。

利用部位：根、莖。

主要成分：含鞣質、樹脂。

功　　效：根莖滋補藥、補精壯陽、散寒除痹。治陽痿、腰膝冷痛、筋骨痿弱、麻木不能行。

產　　地：新竹。

編　號：123

山藥

別　　名：淮山藥、山藥薯、山芋
科　　名：薯蕷科(Dioscoreaceae)
學　　名：*Dioscorea opposita* Thunb
生育特徵：多年生藤蔓草本植物，塊莖肥厚，葉對生或輪生，葉腋間常生珠芽，葉呈三角狀卵形，三角狀廣卵形。花單性，黃綠色，穗狀花序，蒴果。
繁殖方法：珠芽繁殖法、塊莖繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含薯蕷皂苷。
功　　效：根、莖、藤、珠芽均可藥用。可治尿多、滑數不禁、痰氣喘急、腫毒、凍瘡、壯脾胃、益精髓。
產　　地：中國、台灣新竹。

編　號：124

射干

別　　名：尾蝶花、紅尾蝶花
科　　名：鳶尾科(Iridaceae)
學　　名：*Belamcanda chinensis* DC
生育特徵：多年生宿根草本植物，根莖橫走，節狀，內部鮮黃色，葉互生，廣劍形；總狀花序，頂生，橙黃色；蒴果。由大陸引種，目前散生台灣各地，喜生於山野且有陽光之地。
繁殖方法：分株或實生繁殖法。
利用部位：根、莖。
主要成分：生物鹼。
功　　效：根莖為清熱解毒、降氣、祛痰、散血、消腫、通經。治扁桃腺炎、腫瘍、咽喉腫痛、咳逆上氣、疾涎壅塞、瘧疾、跌打、通便。
產　　地：新竹。

山薑

編　　號：125

別　　名：山姜

科　　名：薑科(Zingiberaceae)

學　　名：*Alpinia japonica* Mig

生育特徵：多年生草本植物，葉互生，長橢圓形或廣披針形；總狀花序，花白色帶紅條紋；漿果。自生於台灣低海拔山林或再生林內且有陽光地。

繁殖方法：分株或實生繁殖法。

利用部位：花、子、塊莖。

主要成分：含精油及生物鹼。

功　　效：花、子健胃，治霍亂、解酒。塊莖治腹中冷痛。在日本種子稱伊豆縮砂、健胃。

產　　地：新竹。



薑黃

編　　號：126

別　　名：寶鼎香、黃薑

科　　名：薑科(Zingiberaceae)

學　　名：*Curcuma aromatica* Salisb.

生育特徵：多年生宿根草本植物，葉根生，橢圓形；穗狀花序，花白色；蒴果。自生於台灣山野且有陽光之地。

繁殖方法：分株繁殖法。

利用部位：根、莖。

主要成分：含薑黃素。

功　　效：根莖芳香興奮劑，調味料、染色。行氣、破鬱、通經、止痛。治胸腹痛、癥瘕積聚、月經停止、肩臂痺痛、損傷瘀血腫痛、癰腫。

產　　地：新竹。

編　號：127

茶匙癀

別　名：茶匙黃
科　名：堇菜科(Violaceae)
學　名：*Viola diffusa* Ging
生育特徵：一年生草本植物，葉叢生，圓卵形或卵狀橢圓形；花淡紫色或白色。喜生於台灣因濕地且有陽光之處。
繁殖方法：分株繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：生物鹼。
功　效：祛風、解熱。
產　地：新竹。

編　號：128

舒筋藤

別　名：瘤莖藤、寬筋藤、松根藤
牛掙藤、大接筋藤
大松身、伸筋藤
中華青牛膽、鬆筋藤
科　名：防己科(Menispermaceae)
學　名：*Tinospora sinensis* （*Lour.*）*Merr.*
生育特徵：多年生木質藤本植物，葉互生，卵狀心形，莖生瘤。花淡黃色，總狀花序，核果。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：莖治黃疸病、腹痛、腹瀉、腰痛及驅虫、解熱、滋補、瘧疾、利尿、糖尿病。莖葉外用治癬疥。並為舒筋活絡、祛風止痛、風濕痺痛、坐骨神經痛、跌打損傷、風濕關節炎。
產　地：中國、日、韓、南亞、台灣、新竹。

闊葉大豆

編　　號：129

別　　名：千觔拔、細葉千斤拔
金門一條根、一條根
臭空仔

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Glyine tomentella* Hayata

生育特徵：蔓性草本植物，葉為羽狀三出複葉，小葉橢圓形，花紫色，總狀花序，莢果。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根、全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採收根為平肝、健體止盜汗、強壯。治風濕、強筋骨、壯身體、補氣血、助陽道。

產　　地：中國、台灣、金門。



掌葉瓜

編　　號：130

別　　名：栝樓、掌葉栝樓

科　　名：葫蘆科(Cucurbitaceae)

學　　名：*Trichosanthes laceribracteata* Hay

生育特徵：掌葉攀援藤本植物，葉互生，掌狀葉；花單性，大形，白色；果橢圓形。喜生於台灣山坡林緣或山澗陰濕且有陽光之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：塊根。

主要成分：含皂苷。

功　　效：解熱。

產　　地：新竹。



火筒木

編　　號：131
別　　名：番婆怨、蕃婆怨
　　　　　番婆樹、紅吹風
科　　名：火筒樹科(Leeaceae)
學　　名：*Leea guineensis* G. Don.
生育特徵：多年生常綠小喬木，葉互生，羽狀複葉，小葉披針形，卵形，卵狀橢圓形，聚繖花序，腋生，花紅色，漿果。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：生於山野叢木中，採根、葉為清熱、收斂生肌、風濕、解毒、消腫。外用瘡瘍腫毒。
產　　地：蘭嶼、恆春。

穿心蓮

編　　號：132
別　　名：欖核蓮、一見喜
　　　　　圓錐鬚藥草、苦胆草
科　　名：爵床科(Acanthaceae)
學　　名：*Andrographis poniculata* (Burm. f.) Nees.
生育特徵：一年生草本植物，葉對生，卵壯矩圓形至矩圓狀披針形；總狀花序，頂生或腋生，花白色；蒴果。喜生於台灣山野等地且有陽光之處。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：生物鹼。
功　　效：全株為清熱、解毒、消腫、急性胃腸炎、氣管炎、肺炎、肺結核、濃瘍、高血壓。
產　　地：新竹。

木芙蓉

編　號：133

別　名：醉酒芙蓉

科　名：錦葵科(Malvaceae)

學　名：*Hibiscus mutabilis* L.

生育特徵：多年生落葉性灌木或小喬木植物，葉互生，葉片大，闊卵形或心臟形，掌狀3~7裂，裂片三角形；花腋生或簇生枝端，最初開白色或淡粉紅色，爾後轉深紅色；蒴果。喜生臺灣全境山麓，叢林內自生且有陽光地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：莖、葉、花。

主要成分：黃酮苷。

功　效：為清熱涼血瘀、止痛、排膿、除癰、清肺、解毒。

產　地：新竹。

埔銀

編　號：134

別　名：雞仔麻、山黃皮、雞杧頭山埔崙、埔銀片、埔銀頭山埔銀、地棉根、埔崙頭浦崙頭、埔崙根、埔崙仔山埔崙仔

科　名：瑞香科(Thymelaeaceae)

學　名：*Wikstroemia indica* C.A.Mey.

生育特徵：多年生灌木植物，葉對生，倒卵形，花頂生，淡黃色，漿果。

繁殖方法：實生繁殖法、扦插繁殖法。

利用部位：根莖。

主要成分：生物鹼。

功　效：根莖為治跌打、梅毒、花柳病、關節炎、結核病、百日咳、煎汁洗痲瘋。

產　地：新竹。

瓜葉馬兜鈴

編　　號：135

別　　名：黃藤、黃陳、青木香

科　　名：馬兜鈴科
(Aristolochiaceae)

學　　名：*Aristolochia cucurbitifolia* Hay

生育特徵：多年生藤本植物，葉互生，其葉似瓜葉；花腋生；蒴果。喜生於平也且陰濕有陽光地。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：根。

主要成分：生物鹼。

功　　效：治毒蛇傷。

產　　地：新竹。

港口馬兜鈴

編　　號：136

別　　名：天仙藤、青木香、黃陳

科　　名：馬兜鈴科
(Aristolochiaceae)

學　　名：*Aristolochia kankauensis* Sasaki

生育特徵：多年生攀援性蔓生植物，葉互生，倒心形三角狀；花腋生，白色花；蒴果。喜生於台灣平野山地且陰濕有陽光之處。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：根、藤。

主要成分：生物鹼。

功　　效：治蛇傷、腹痛。

產　　地：新竹。

編　號：137

金瘡小草

別　名：雪裏青、筋骨草
白毛夏枯草、散血草
紅白尾蜈蚣、矮金瘡草。

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Ajuga pygmaea* A. Gray.

生育特徵：多年生草本植物，葉對生，倒披針形；開濃紫色花，簇生；果四分果，分果卵球形。喜生台灣低海拔山野、路旁、果園內自生。

繁殖方法：實生法或扦插繁殖法。

利用部位：葉。

主要成分：含生物鹼。

功　效：葉為收斂劑、治金瘡及刺傷。

產　地：新竹。

編　號：138

白花草

別　名：白花菜、羊角菜

科　名：白花菜科(Capparidaceae)

學　名：*Cleome gynandra* L.

生育特徵：多年生草本植物，葉互生，掌狀複葉，小葉 5 片，倒卵形；開白花，總狀花序；果為長莢，種子為黑色。自生於中部原野、路旁、果園內且有陽光之地。

繁殖方法：實生繁殖法及扦插繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草清熱解熱、利尿、祛瘀退癀。治跌打、敗腎、淋病。

產　地：台灣。

編　　號：139

安石榴

別　　名：石榴

科　　名：安石榴科(Punicaceae)

學　　名：*Punica granatum* L.

生育特徵：多年生灌木；葉披針形；花白色。果實圓形，成熟時變紅；耐乾燥，陽光充足地區。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：皮、果實。

主要成分：果實含果糖、維生素等。

功　　效：皮為條蟲驅除劑、果皮為腸收斂劑；治慢性下痢及腸痔出血等，果供食用。

產　　地：新竹。

編　　號：140

細號嗽血草

別　　名：圓葉金午時花
圓葉嗽血草

科　　名：錦葵科(Malvaceae)

學　　名：*Sida cordifolia* Linn

生育特徵：多年生灌木狀草本，葉卵形或近心形，花單生，簇生，開橙黃色花，蒴果。全草含麻黃素等成分。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：麻黃素。

功　　效：採全草，有清熱解毒、行氣活血、拔膿消腫。治發熱、咳嗽、風寒、腹瀉、痢疾、肝炎、腰腳勞損、淋病、白帶、尿頻、痔瘡、腫毒。根有解熱、鎮痛、鎮痙、解毒。種子壯陽。

產　　地：中國、台灣、新竹。

編　　號：141

黃鵪菜

別　　名：山芥菜、山根龍
山菠薐
科　　名：菊科(Compositae)
學　　名：*Youngia japonica* (Linn.) DC.
生育特徵：一年生或越年生草本，主根肥厚，白色，莖直立。基部葉叢生，葉呈倒披針形，莖生葉互生，葉片狹長，羽狀分裂。頭狀花序，花黃色，瘦果。
繁殖方法：分枝及扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：全草利尿、解熱、腸胃解熱。
產　　地：中國原產、台灣繁殖。

編　　號：142

釘錘草

別　　名：石豇豆、石澤蘭
千錘打、石弔蘭
紫背金盤
科　　名：苦苣苔科(Gesneriaceae)
學　　名：*Lysionotus pauciflorus* Maximowicz.
生育特徵：常綠小灌木，高 20-30 公分，根肥大呈塊根，葉對生或輪生，葉長 3-6cm，寬 8-15mm，花聚繖花序，腋生或頂生，綠白色或粉紅色。蒴果 6-10cm，種子細小，紡錘型，褐色。花期 7-9 月，果期 9-12 月。
繁殖方法：實生繁殖法、分株繁殖法。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草清肺祛痰、涼血止血、去濕化滯、通絡止痛。治肺熱咳嗽、淋巴結核、支氣管炎、風濕痺痛、跌打損傷、吐血。
產　　地：中國、日本、台灣。

編　　號：143

猿尾藤

別　　名：紅藥頭、風車藤
風箏果、牛牽藤
虎尾藤、紅龍。

科　　名：黃褥花科(Malpighiaceae)

學　　名：*Hiptage benghalensis* (Linn) Kurz.

生育特徵：多年生藤本。藤蔓性，葉常綠橢圓形。耐旱，陽光充足地區。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：葉、樹皮、莖。

主要成分：維生素、礦物質等。

功　　效：葉治哮喘、皮膚病、樹皮苦補劑。莖祛瘀。治筋骨痠痛、體弱虛汗遺精。

產　　地：新竹。

編　　號：144

山月桃

別　　名：南薑、紅三七
小號月桃

科　　名：薑科(Zingiberaceae)

學　　名：*Alpinia intermedia* Gagn

生育特徵：多年生草本。塊莖肥大且分支；葉長橢圓形且大；開白色花，聚合花序。性喜多水潮濕且陽光充足之地。

繁殖方法：塊莖繁殖法。

利用部位：塊、莖。

主要成分：澱粉、維生素、礦物質類物。

功　　效：根莖治腹水症，燉青蛙服。又法南薑加當歸煎麻油治胃寒症。

產　　地：新竹。

崖椒

編　　號：145

別　　名：兩面刺、雙面刺
入地金牛、兩面針
花椒刺

科　　名：芸香科(Rutaceae)

學　　名：*Fagara nitida* (Roxb) DC

生育特徵：多年生藤本，葉長橢圓形，葉面均有刺。性喜乾旱陽光足之地。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：根、莖。

主要成分：維生素、礦物質。

功　　效：根莖治風濕、牙痛、肺癰、蛇傷、瘡癤、花柳病。治跌打、痰水瀝核、喉症。

產　　地：新竹。

猴兒草

編　　號：146

別　　名：娃兒草、蘭花蔘、藍花草
沙蔘草、土蔘、細葉沙蔘

科　　名：桔梗科(Campanulaceae)

學　　名：*Wahlenbergia marginata*(Thunb.)A.DC

生育特徵：多年生草本，高 20-40cm，主根粗肥，莖叢生，直立，葉互生，倒披針形或線狀披針形，長 2-4cm，寬 3-8cm，花單生，藍色，蒴果，倒圓錐形，種子細小，長橢圓形，黑褐色。花期 3-5 月，果期 5-6 月。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草，補虛損、肺腎、脾胃、止汗、清熱、化痰、止咳、止血。治虛損勞傷、肺疾、咳血、咳嗽、自汗、盜汗、胃痛、高血壓。

產　　地：中國、日本、馬來西亞、印度、澳洲、紐西蘭及台灣。

編　　號：147

四葉蓮

別　　名：四季春、四藥連
　　　　　台灣及己
科　　名：金粟蘭科
　　　　　(Chloranthaceae)
學　　名：*Chloranthus oldhami* Solms
生育特徵：多年生草本，具 4 葉，葉為卵形，宿根。性喜陰濕之地。
繁殖方法：扦插、塊莖繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：澱粉、維生素、礦物質等。
功　　效：全草解毒、消炎、治毒蛇傷及腹痛。
產　　地：新竹。

編　　號：148

台灣黃芩

別　　名：台灣立浪草、藍花黃芩
　　　　　耳挖草
科　　名：唇形科(Labiatae)
學　　名：*Scutellaria formosana* N.E.Brown
生育特徵：多年生草本。莖分枝稜形。葉對生倒心形；總狀花序，白花小；堅果。性喜潮濕且陽光充足之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：香氣油、礦物質等。
功　　效：全年採全草解熱發表散瘀止痛，治感冒、肝病、疔瘡、跌打損傷。
產　　地：新竹。

編　號：149

立骨羊乳

別　　名：藤胡頹、羊奶子三目黃子
科　　名：胡頹科(Elaeagnaceae)
學　　名：*Elaeagnus glabra* Thunb.
生育特徵：自生台灣各地，尤喜向陽之常綠蔓生灌木，葉互生，卵形或橢圓狀卵形，花腋生。白色，核果。
繁殖方法：實生繁殖法、扦插繁殖法。
利用部位：果實、根及幹。
主要成分：生物鹼。
功　　效：果實治腳氣病。根及幹治風濕疼痛、跌打傷痛。
產　　地：新竹。

編　號：150

軟枝藍

別　　名：細葉木藍
科　　名：豆科(Leguminosae)
學　　名：*Indigofera inifdia* Rexz
生育特徵：多年生草本，葉卵形至長橢圓形。性喜乾旱陽光足之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：枝、葉。
主要成分：含藍色素。
功　　效：枝葉可作為染料用。
產　　地：台灣中、南、東部、新竹。

編　號：151

葛鬱金

別　名：竹芋、粉薯、金筍
芝粉、紫薯、林藷

科　名：葛鬱金科(Marantaceae)

學　名：*Maranta arundinacea* L.

生育特徵：多年生草本，宿根，地下根肥大，葉披針形。性喜乾旱陽光足之地。

繁殖方法：分枝及塊莖繁殖法。

利用部位：塊莖。

主要成分：澱粉。

功　效：塊莖治毒箭傷，調製膏藥敷傷療毒。製澱粉，供幼兒或病人食用，易消化，適於腸胃病者。製糕餅、化粧用白粉、粘膠、亦可製酒精。渣為飼料或精油蒸餾用，粗粕為肥料及工藝品打底塗料。

產　地：中國、日、韓、新竹。

編　號：152

鈕仔茄

別　名：小指茄、五宅茄、刺柑子

科　名：茄科(Solanaceae)

學　名：*Solanum indicum* L.

生育特徵：多年生小灌木，葉互生，短圓狀卵形，長 2-5cm，聚繖花序側生，小花藍紫色，漿果球形，熟黃色。性喜乾旱陽光足地。

繁殖方法：實生法繁殖法。

利用部位：根、莖、果。

主要成分：小指茄鹼。

功　效：採根、莖、果為散風、解毒、解熱、醒酒、散瘀止痛；有小毒、治肝、腫毒、痣瘡。

產　地：新竹。



編　號：153

閉鞘薑

別　名：樟柳頭、絹毛鳶尾
　　　　水蕉花、白石笋
科　名：薑科(Zingiberaceae)
學　名：*Costus malortieanus* Wendl
生育特徵：多年生草本，葉披針形，塊莖肥大；穗狀花序，開粉紅色花。性喜乾旱陽光足之地。
繁殖方法：塊莖繁殖法。
利用部位：根、莖。
主要成分：薑黃素、礦物質等。
功　效：根、莖為行水、消腫，治水腫腹脹及血崩。
產　地：新竹。

編　號：154

紫蘇

別　名：回回蘇、紅紫蘇、荏
科　名：唇形科(Labiatae)
學　名：*Perilla frutescens* Britton var *crispa* Decaisne f. purpurea Makino.
生育特徵：一年生或二年生草本，葉披針形；穗狀花序；種子小。性喜乾濕適中陽光足之地。
繁殖方法：實生法繁殖法。
利用部位：根、莖、葉、果實。
主要成分：含紫蘇素。
功　效：葉、果為興奮性發汗、鎮靜、鎮咳、鎮痛、利尿劑。
產　地：中國、日、韓。

編　號：155

火炭母草

別　名：冷飯藤、秤飯藤
紅骨冷飯藤、清飯藤
赤地利、喉科草
白飯草、斑鳩飯

科　名：蓼科(Polygonaceae)

學　名：*Polygonum chinense* L.

生育特徵：多年生草本，葉披針形。匍匐性莖，開白花，果熟時黑色。性喜乾旱陽光足之地。

繁殖方法：扦插、塊莖繁殖法。

利用部位：嫩梢葉、根。

主要成分：火炭母草素。

功　效：嫩梢葉治跌打、閃挫、飛揚、敷腫毒、癰疽。去皮膚風熱、流注骨節。根為轉骨、消炎、通經，主治小兒發育不良、跌打，久年打傷。

產　地：新竹。

編　號：156

九里明

別　名：提湯菊

科　名：菊科(Compositae)

學　名：*Wedelia biflora* (L.) DC

生育特徵：多年生草本，葉廣卵形；花為黃色管狀花。性喜乾旱陽光足之地。

繁殖方法：扦插、塊莖繁殖法。

利用部位：葉。

主要成分：植物鹼。

功　效：葉敷腫毒、蛇傷，治肝病、肺炎、肺積水。

產　地：新竹。

編　號：157

白鳳豆（白）

別　名：洋刀豆、白刀豆
白關刀豆
科　名：豆科(Leguminosae)
學　名：*Canavalia ensiformis* DC
生育特徵：一年生藤本植物，高100cm，葉互生，3出葉，小葉大形卵狀或卵狀橢圓形、廣橢圓形，長 7.5-15cm，寬6-10cm，花序腋生，蝶形，淡紫色，種子白色，性喜乾濕適中陽光足之地。
繁殖方法：實生法繁殖法。
利用部位：種子、根及果殼。
主要成分：含白鳳豆鹼。
功　效：種子為強壯、祛痰、根治痛風。
產　地：菲律賓及美洲等地、新竹。

編　號：158

白鳳豆（赤）

科　名：豆科(Leguminosae)
學　名：*Canavalia ensiformis* Dc.
生育特徵：一年生藤本植物，葉廣橢圓形；花腋生，紫花；莢果。性喜較濕適中陽光足之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：種子、根。
主要成分：含白鳳豆鹼。
功　效：種子為強壯祛痰；根治痛風。
產　地：新竹。

編　號：159

散血草

別　名：筋骨草、有苞筋骨草
百症草、雲南夏枯草
白尾蜈蚣
科　名：唇形科(Labiatae)
學　名：*Ajuga bracteosa* Wall.
生育特徵：一年生草本，葉廣卵形，有毛；開淺白色花。性喜陰濕陽光足之地。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。
利用部位：全草或莖葉。
主要成分：礦物質。
功　效：葉解熱、外用止血。全草或莖葉。療金瘡、腫瘡及毒蛇咬傷。治腹痛、發燒、喉痛、跌打、肺病、感冒等。
產　地：新竹。

編　號：160

車前草

別　名：車錢草、錢貫草
五筋草、五斤草
五根草、車前
車輪草、蒲杓草
科　名：車前科(Plantaginaceae)
學　名：*Plantago formosana* Tateishi et Masam.
生育特徵：多年生小草本，葉根生，葉呈廣卵形或橢圓形，穗狀花序，腋生，花白色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草及種子。
主要成分：生物鹼。
功　效：全草為解熱、利尿、高血壓。種子治眼疾。
產　地：台灣野生。

一葉草

編　　號：161

別　　名：瓶爾小草
尖頭瓶爾小草
有梗瓶爾小草、一葉草
金劍草、一支劍、獨葉草

科　　名：瓶爾小草科(Ophioglossaceae)

學　　名：*Ophigolossum petiolatum* Hlook

生育特徵：多年生宿根草本，自基部生出葉，葉長橢圓形或匙形，抽出一支花穗，有劍狀之袍子囊著生。

繁殖方法：塊莖繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草為兒科要藥,解熱消炎。主治喉痛、喉痺、口腔疾患、肺炎、蛇傷、心臟病、面疔、疔瘡、乳癰、跌打損傷、淤血腫痛、疥瘡身癢。

產　　地：台灣、新竹。

穗花毛蓮菜

編　　號：162

別　　名：丁豎杇、丁柱杇

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Elephantopus spicatus* (Cass.) Aubl.

生育特徵：多年生草本，葉披針形，對生；穗狀花序，開白花。性喜乾旱陽光足之地。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：植物鹼。

功　　效：全草為利尿劑，主治腎臟病、淋病。

產　　地：新竹。

辣蓼

編　　號：163

科　　名：蓼科(Polygonaceae)

學　　名：*Polygonum blumei* Meisn

生育特徵：一年生或二年生草本，葉披針形；穗狀花序，開白色花，蒴果。性喜乾濕適中陽光足之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：莖、葉。

主要成分：辣蓼素。

功　　效：莖葉為解毒劑、蛔蟲之驅虫劑。

產　　地：新竹。

龍葵

編　　號：164

別　　名：烏子仔菜、烏子菜頭
烏鬼仔菜、烏甜菜

科　　名：茄科(Solanaceae)

學　　名：*Solanum nigrum* L.

生育特徵：多年生草本植物，葉長橢圓披針形；果為漿果。性喜乾濕適中陽光足之地。

繁殖方法：實生法繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：龍葵素。

功　　效：全草為解熱、利尿劑、有抗癌之效。嫩葉、芽為野菜用。

產　　地：新竹。

山澤蘭

編　號：165

別　名：六月雪、班竹相思
大本白花草仔
豎欉白花草

科　名：菊科(Compositae)

學　名：*Eupatorium formosanum* Hay.

生育特徵：多年生草本植物，莖直立，分枝多，葉對生，三深裂或全裂，裂片披針形，頭狀花序，白花，蒴果。

繁殖方法：實生法、分枝繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草為解熱、調經、抗癌。治血癌效果好。

產　地：台灣野生。

狗肝菜

編　號：166

別　名：本地羚羊、六角英
獅子花、金龍柄

科　名：爵床科(Acanthaceae)

學　名：*Dicliptera chinensis* (L.) Nees.

生育特徵：多年生草本植物，葉廣披針形，花白色，蒴果。性喜乾濕適中陽光足之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：植物鹼。

功　效：全草為解熱藥、消炎退癀。主治肺炎、跌打、喉痛、吐瀉。外敷癰疽，亦治肝炎、感冒發熱。

產　地：新竹。



印度莪朮

編　　號：167

別　　名：蓬莪朮、山薑黃
黑心薑、臭屎薑

科　　名：薑科(Zingibetaceae)

學　　名：*Curcuma zedoaria* (Berg.) Rosc.

生育特徵：多年生草本植物，根粗短，末端膨大成紡錘形，葉呈長圓狀橢圓形，中脈紫色。穗狀花序，開粉紅紫色花，蒴果。

繁殖方法：塊莖繁殖法。

利用部位：根莖。

主要成分：薑黃素等。

功　　效：藥用根莖，治子宮頸癌、外陰癌、皮膚癌、氣滯血瘀、經閉、腹痛、飲食積滯、胸腹脹痛、跌打腫痛、腹痛積塊。

產　　地：印度、中國、現台灣野生化。

水蜈蚣

編　　號：168

別　　名：無頭土香、白香附
無頭香、三莢草、球頭草
發汗草、瘧疾草
金紐草、短葉水蜈蚣

科　　名：莎草科(Cyperaceae)

學　　名：*Kyllinga brevifolia* Rottb

生育特徵：多年生草本、葉線形。性喜潮濕陽光足之地。

繁殖方法：分枝繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：香附醶。

功　　效：殺蟲、敗毒、祛風、解熱、感冒、盲腸炎、腹痛。

產　　地：新竹。

綠珊瑚

編　　號：169

別　　名：綠玉樹、鐵樹
光棍樹、鹿角樹

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Euphorbia tirucalli* L.

生育特徵：多年生灌木，全株光滑無毛，枝條肉質，綠色，葉片小，早脫落，多分株。花無花披，雌花具多數總苞。

繁殖方法：扦插法繁殖法。

利用部位：枝條。

主要成分：大戟醇酚。

功　　效：辛微酸，性涼，有毒。催吐、殺蟲。治贅疣、跌打損傷、風溼關節痛、風濕骨痛、腰痛、肺癌、梅毒及治癩痢狗等。

產　　地：新竹。

接骨草

編　　號：170

別　　名：接骨筒、本木賊
木賊草、正木賊草
木賊、四季花、剝節草
節節草

科　　名：木賊科(Eguisetaceae)

學　　名：*Eguisetum ramosissimum* var.*debile* Roxb.

生育特徵：多年生常綠草本，根莖墨色，莖粗，直立。葉輪生，孢子囊穗。

繁殖方法：分枝繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草消翳、散紅、行血。治眼疾、跌打。根治視網膜炎、視神經乳頭炎、視物不清症。

產　　地：自生台灣各處乾旱河床溪邊及路旁、新竹。

編　號：171

賜米草(圓葉)

別　名：賜米草頭、四米草頭

科　名：錦葵科(Malvaceae)

學　名：*Sida rhombifolia* L.

生育特徵：多年生草本，葉菱形圓葉；花淺黃色，蒴果。性喜乾旱陽光足之地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：根、莖。

主要成分：植物鹼。

功　效：採根、莖為清涼解毒、活血散瘀、退火止痛。

產　地：新竹。

編　號：172

賜米草(尖葉)

科　名：錦葵科(Malvaceae)

學　名：*Sida rhombifolia* L.

生育特徵：多年生草本，葉菱形，尖葉；花黃色，蒴果。性喜乾旱陽光足之地。

繁殖方法：實生法繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：植物鹼。

功　效：全草為清涼解毒、活血散瘀、退火止痛。

產　地：新竹。

編　　號：173

賜米草(白花)

科　　名：錦葵科(Malvaceae)

學　　名：*Sida rhombifolia* L.

生育特徵：多年生草本，葉菱形，至橢圓形，開白花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草為清涼解毒、活血散瘀、退火止痛。

產　　地：台灣野生、新竹。

編　　號：174

蛇莓

別　　名：地莓、龍吐珠、蛇婆蛇波、蛇抱、三爪龍地楊梅、蛇泡草

科　　名：薔薇科(Rosaceae)

學　　名：*Duchesnea indica*(Andr) Forcke

生育特徵：多年生草本，多分枝匍匐地上，葉互生，掌狀複葉，小葉倒卵形或稜狀卵形；單生花，腋生，花黃色；果紅色。性喜潮濕陽光足之地。

繁殖方法：實生法及扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：蛇莓素。

功　　效：全草為清熱、涼血、消腫、解毒。治熱病、驚癇、咳嗽、吐血、咽喉腫痛、痢疾、癰腫、疔瘡、毒蛇咬傷、燙火傷、胃病、通經

產　　地：新竹。

編　　號：175

虎尾蘭

別　　名：老虎尾、弓弦麻

科　　名：百合科(Liliaceae)

學　　名：*Sansevieria nilotica* Baker

生育特徵：多年生草本，葉狹披針形。開白花，蒴果。性喜乾旱陽光足之地。

繁殖方法：分株繁殖法。

利用部位：葉、種子。

主要成分：皂素、脂肪油。

功　　效：供纖維及觀賞用。葉有清熱解毒、去腐生肌、感冒、咳嗽、肝脾腫、大蛇傷、跌打損傷、全株外用治瘰瀝。葉含皂素（saponin）及脂肪油（種子）。

產　　地：新竹。

編　　號：176

賜米草

別　　名：金午時花、王不留行四米草、四美草

科　　名：錦葵科(Malvaceae)

學　　名：*Sida rhombifolia* Linn

生育特徵：小灌木，高 10-100cm，葉片長圓狀披針形，長 2-4.5cm，寬 1-2cm，花單生，黃色，蒴果盤狀扁圓形。花期 5-10 月，果期 9-2 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草或根。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草或根有清熱利濕、活血散瘀、解毒排膿、消炎生肌、益氣止痛之效。治感冒發熱、腸炎菌痢、肝病、黃疸、哮喘、耳炎膿血、化膿炎症、癰癤潰瘍。

產　　地：中國、台灣、新竹。

編　號：177

薄荷

別　名：蕃荷葉、葉息花、卜荷
科　名：唇形科(Labiatae)
學　名：*Mentha sachalinensis* Kudo
生育特徵：多年生草本，葉披針形；唇形花。性喜乾濕適中陽光足之地。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：薄荷油。
功　效：全草疏風、散熱、闢穢、解毒、清利頭目。外感發熱、頭痛、咳嗽、目赤、咽喉腫痛、皮膚癮疹。食滯氣脹、牙痛。其所含薄荷油為芳香性矯味、矯臭、健胃、驅風、發汗劑。治腸異常發酵、疝痛、下痢等。外用神經痛。
產　地：世界各地均產、新竹。



編　號：178

韭蘭

別　名：天蒜、紅玉簾、賽番紅花韭蓮、旱水仙、韭葉水仙
科　名：石蒜科(Amaryllidaceae)
學　名：*Zephyranthes carinata* Herb.
生育特徵：多年生草本植物，葉線形。性喜乾濕適中陽光地。
繁殖方法：分枝繁殖法。
利用部位：鱗莖。
主要成分：天蒜素。
功　效：全草有散熱解毒，活血涼血之效。治吐血、血崩、跌打紅腫、毒蛇咬傷。鱗莖外用搗敷乳癰、毒瘡。
產　地：新竹。

編　號：179

薑三七

別　名：莪朮、三七仔、藍心薑
黑心薑、薑七、蓬莪术

科　名：薑科(Zingiberaceae)

學　名：*Curcuma zedoaria* (Berg) Rosc

生育特徵：多年生草本植物，葉長橢圓披針形。性喜乾濕適中陽光地。

繁殖方法：塊莖繁殖法。

利用部位：根、莖。

主要成分：薑黃素。

功　效：祛瘀行氣、消積舒肝、破血、止痛。根莖為芳香健胃、消炎。治跌打損傷、子宮癌。

產　地：新竹。

編　號：180

白紫蘇

別　名：假紫蘇、山紫蘇
臭蘇、狗屎蘇

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Perilla furtescens* (Linn) Brittiner

生育特徵：一年生草本，高 50-150cm，全株有香氣。莖直立，鈍四菱形，淡綠色，被毛多分枝。葉對生，柄長 1-4.5cm，葉片卵形或卵狀圓形，長 3-10cm，寬 2-8cm，基部圓形或廣楔形，鋸齒緣，總狀花序腋生及頂生。小堅果，褐色或灰白色，倒卵形，細小。花期 7-9 月，果期 9-11 月。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：發表散寒、理氣。治咳嗽痰多、風寒、感冒、發燒、胸悶、骨刺、痔瘡、肺癰、蛔蟲及噎膈反胃、心痛等。

產　地：新竹。

山柰

編　號：181

別　名：三柰、沙薑
番鬱金、埔薑花

科　名：薑科(Zingiberaceae)

學　名：*Kaempferia galanga* L.

生育特徵：多年生草本植物，葉倒卵形；塊莖肥大。性喜乾濕適中陽光地。

繁殖方法：分枝、塊莖繁殖法。

利用部位：根、莖。

主要成分：薑黃素。

功　效：採根莖為散寒、除濕、溫脾胃避惡氣。芳香健胃藥、薰香料。治胸腹冷痛、寒濕吐瀉、蛀牙痛。

產　地：新竹。

望江南

編　號：182

別　名：扁草決、羊角豆
野扁豆、山綠豆

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Cassia occidentalis* L.

生育特徵：多年生草本，葉披針形；種子腎形。性喜乾濕適中陽光足之地。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：種子、葉。

主要成分：植物鹼。

功　效：採種子治腹痛、下痢、慢性便祕、頭痛健胃整腸。採葉為解熱劑、治蛇傷。全草為緩瀉。

產　地：新竹。

編　號：183

苿草

別　名：銳葉小槐花、磨仔草
抹草、鰱魚鱗、大魚鱗
磨草、希占草
科　名：豆科(Leguminosae)
學　名：*Desmodium caudtum* (THBG.) DC.
生育特徵：多年生草本，葉披針形、有毛；莢果。性喜乾旱陽光足之地。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。
利用部位：枝、葉、根。
主要成分：苿草素。
功　效：可治吐血、帶下癰腫、產後血行及腹痛，根為眼藥、治肺癰、消炎、散血、解毒。
產　地：新竹。

編　號：184

天名精

別　名：蝦蟆草、蝦蟆藍、天門精
科　名：菊科(Compositae)
學　名：*Carpesium abrotanoides* Linn.
生育特徵：多年生草本，高 30-100cm，臭味，莖直立，葉互生，廣橢圓形或矩圓形，長 8-15cm，寬 4-8cm，花管狀花，黃色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採全草鎮痙、降溫、退熱及驅蟲、止血、解毒、急性肝炎、痔瘡、腫毒。果實有解毒、殺蟲之效。治蟲積腹痛、心痛、惡瘡。
產　地：中國、韓、日、印及台灣、新竹。